

四庫全書

子部

不節飲食無度生食五辛熱啖炙燂久視勤書憂哀悲
泣皆能病目况方論有八廓内外障等之證茲不復叙
治療之法必須洞明形狀細察根元窮其是非若能細
審無不瘥除然病眼之人不得當風看日喜怒房勞五
辛炙燂酒食毒物並宜斷之惟須寬緩情性慎護調攝
即無不瘥也若縱恣乖違觸犯禁忌自貽其咎必致喪
明而後已可不謹歟

杏連散 治風熱上攻羞明澀痛

黃連

去鬚一錢槌碎

杏仁

七粒槌碎

右用水半盞二藥浸之飯上蒸一時久澄清放溫洗
了用紙蓋覆安頓湯瓶上頻頻洗之

補腎丸

治腎氣不足眼目昏暗瞳神不分明漸成內

障

磁石

火煨醋淬七次水飛

兔絲子

淘淨酒浸蒸別研各二兩

五味子

熟地黄

酒蒸焙

枸杞子

楮實子

覆盆子

酒浸

肉蓯蓉

酒浸焙

車前子

酒蒸

石斛

去根各一兩

沉香

研別

青鹽

別研各
半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十九空心鹽

湯下

冷補丸 治腎水燥少不受峻補口乾多渴耳痒耳聾

腰痛腿弱小便赤澀大便或難

熟地黄

酒蒸
焙

生地黄

洗

天門冬

去心

川牛膝

去蘆
浸

白芍藥

地骨皮

去木

白蒺藜

炒

麥門

去心
冬

石斛

去根

玄參

磁石

火煨七次
研水飛過
細

沉

香

別研不見
火各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下

養肝丸

治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力

當歸

去蘆酒浸

車前子

酒蒸焙

防風

去蘆

白芍藥

麴仁

別研

熟地黃

酒蒸焙

川芎

楮實子

各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸溫熱水下不拘時候

羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅胃裏炎

炎

羚羊角

鎔

柴胡

去蘆

黃芩

川當歸

決明子

羌活

去蘆

赤芍藥

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

桑白皮散 治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日

夜疼痛心胃煩悶

玄參

桑白皮

枳殼

去瓢
麩炒

川升麻

杏仁

去皮

失炒

旋覆花

去皮
梗

防風

去蘆

赤芍藥

黃芩

甘菊花

去枝
梗

甘草

炙

甜葶藶

炒各
一兩

右呔咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去

滓食後溫服

爐甘石散

治一切目疾不問得疾之因悉皆治之

爐甘石

半斤用黃連四兩如豆大于銀石器內煮一伏時去黃連取石研

腦子

別研二

錢半

右件和勻每服半字白湯泡放溫時時洗之

決明子散 治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生翳膜
或背出努肉或痒或澁羞明多淚或始則昏花漸成內
障但是一切暴風客熱皆宜服之

黃芩

甘菊花

去枝梗

木賊

決明子

石膏

赤芍藥

川芎

川羌活

去蘆

石決明

各一兩

甘

草 蔓荊子

各一兩

右為細末每服三錢水一中盞生薑五片煎至六分

食後服

太清散 治暴風客熱目赤睛痛癰澁難開

銅青

半兩
別研

薑粉米

二錢
半

右藥研細和勻每用少許沸湯泡放溫頻洗之

造薑粉法臘月間用生薑洗切碎於砂盆內搗爛以新麻布裂汁澄脚取粉陰乾

秦皮散 治暴風客熱赤眼腫痛痒澁眵淚昏暗

滑石

秦皮

黃連

去鬚
等分

右為細末每用半錢沸湯泡澄清溫洗不拘時候

後論曰夫眼者內則屬乎五藏外則應乎五藏瞳神黑
水腎之主也血輪如環心之主也絡裏者脾之主也白
睛屬肺總管於肝眼帶雖係於肝明孔通通五藏五藏
皆有神善攝生者調五藏以養神神安則藏和藏和則
眼目清淨自無疾矣凡所感之由與夫治療皆可選而
用之

耳

論曰夫耳者腎之候腎者精之所藏腎氣實則精氣上通聞五音而聰矣若疲勞過度精氣先虛於是乎風寒暑濕得以外入喜怒憂思得以內傷遂致熱壅耳聾耳鳴加之出血出膿則成聾耳底耳之患候其顴頰色黑者知其耳聾也亦有手少陽之脉動厥而聾者耳內渾渾惇惇也手太陽脉動厥而聾者耳內氣滿也大抵氣厥耳聾尚易治精虛耳聾不易藥諸証既殊治各有法

塞耳丸

治耳聾無不効

澹寮方名塞耳丹

石菖蒲

一寸

巴豆

去皮一枚

全蝎

一枚去毒

右為細末葱涎打和如棗核大綿裹納耳中

杏仁散 治耳卒痛或有水出

杏仁

一錢炒令焦

右研為末葱涎搜和捏如棗核大綿裹塞耳中

又方 治耳暴聾

雄黃

一錢

巴豆

一箇去殼

右同研令細用葱涎和作一錠子紙捲定塞耳中

茯苓丸

治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉茯苓

酒浸切
片焙

山茱萸

去核

石龍芮

石菖蒲

兔絲子

淘淨酒
浸蒸焙

川羌活

去蘆

鹿茸

燎去毛切
片酒浸蒸

磁石

火煨醋淬
七次水飛

石斛

去根

附子

炮去皮臍
各一兩

全

蝎

去毒二
七箇

麝香

一字
旋入

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸加至一

百丸空心鹽酒鹽湯任下

磁石丸

治風虛耳聾無聞

磁石

火煨

防風

去蘆

羌活

去蘆

黃耆

去蘆鹽水浸焙

木

通

去麋皮

白芍藥

桂心

不見火各一兩

人參

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半羊腎一對切片去脂膜

煎至七分去滓食前溫服

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉翳腫掣痛濃血流

出

犀角

鎔

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小

豆

炒

甘菊花

去枝梗各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

玄參湯 治腎臟實熱心胃煩悶耳聽無聲四肢拘急
腰背俛仰強痛

生地黃

洗

玄參 五加皮

去木

黃芩 赤茯苓

去皮

通草

石菖蒲

甘草

炙

羚羊角

鎊

麥

門冬

去心各等分

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

鼻

論曰夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭矣若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其為病也為衄為癰為息肉為瘡瘍為清涕為室塞不通為濁膿或不聞香臭此皆肺藏不調邪氣蘊積於鼻清道壅塞而然治之之法寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄不可遽止如出

三升已上恐多者方可斷之活人書所謂衄血者乃解
蓋陽氣重故也不可不知

又論曰夫鼻者肺之所主職司清化調適得宜則肺臟
宣暢清道自利攝養乖方則清道壅塞故鼻為之病焉
蓋肺主於氣肝藏於血邪熱傷之則血熱血熱則氣亦
熱血氣俱熱隨氣上逆故為鼻衄甚則生瘡風寒乘之
陽經不利則為壅塞或為清涕蘊積不散則不聞香臭
或為鼻鼽或生息肉鼻痛之患矣又有熱留膽府邪移

於腦遂致鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄衄瞑目
故得之氣厥也

梔子仁丸 治肺熱鼻發赤癰俗曰酒瘡鼻

梔子仁

右為末溶黃蠟等分和為丸彈子大空心茶酒嚼下
半月効忌酒炙燂

又方

枇杷葉

去毛
焙乾

右為末茶調下一二錢日三服

辛夷散 治肺虛風寒濕熱之氣加之鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁

細辛

洗去土葉

藁本

去蘆

升麻

川芎

木通

去節

防風

去蘆

羌活

去蘆

甘草

炙

白芷

各等

分

右為細末每服二錢食後茶清調服

危亦林得効方加蒼耳一半熟

者茶調散

合和服

蒼耳散

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

孫氏仁存活法秘方云腦冷所

致此疾亦有腦熱者亦有肺寒者素問曰臍移熱於腦則辛頰鼻淵又曰泣涕者腦也腦滲為涕又曰肺之液為涕其來各有由矣當審詳之鼻淵濁涕不止清濁亦自異

辛夷仁

半兩

蒼耳子

二錢半

香白芷

一兩

薄荷葉

半錢

右並日乾為細末每服二錢用葱茶清食後調服

口

論曰夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也蓋

五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五藏之氣也節宣微爽五藏之氣偏勝由是諸疾生焉且鹹則為寒酸則停滯澀則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃腑臟臊腐之不同蘊積於胃膈之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然醫療之法各隨其所因以治無使過與不及焉

又論曰夫口者脾之候齒者骨之餘髓之所養也人之一身此為大要凡有病起因口而成含惡氣以嚙津液

痰癖而在膈心胃壅滯毒氣攻烝熏之既久故齒為之病焉其諸風寒蘊熱而得之者方載於後

芎藭膏 治口氣熱臭

香白芷 芎藭

各等分

右為細末煉蜜丸如雞豆大食後臨卧噙化

丁香丸 治口臭穢

丁香

三錢

甘草

一錢

芎藭

二錢

白芷

半錢

右為細末煉蜜丸如彈子大綿裹一九噙嚥津

碧雪 治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌
根緊強言語不正腮項腫痛

蒲黃 青黛 硃砂 焰硝 甘草

各等分

右為細末每用手指捻摻於喉中津嚥或呷少冷水
送下頻頻洗之

青金散 治小兒白口瘡急惡狀似木耳

洹川王
一即方

五倍子

去土垢
四兩

青黛

四錢

右為細末好油調鴉羽掃口向咽喉流入咽喉中瘡

爛次日便下兼治痔瘡亦佳

麝香散 治急疔惡蝕肉損

枯白礬

二兩

黃丹

一錢半炒

麝香

一字

右為細末研勻乾擦牙疔處頻上

朱粉散 治白口瘡惡及牙疔蝕

枯白礬

一兩

乾胭脂

一錢半

輕粉

半錢

麝香

少許

右研勻油調掃口瘡或乾貼

蛾黃散 治赤白瘡疹唇破兼治熱瘡

黃蘗

去皮

寒水石

燒

右各等分為細末乾貼口瘡上塗唇上兼治諸瘡較遲者

粉紅散 治小兒白口瘡咽喉惡爛聲啞

乾胭脂

一錢

枯礬

一兩

右研勻每用一錢生蜜調如稀糊掃口瘡咽喉內咽了藥來日大便退了瘡皮為驗

大青湯 治咽喉唇腫口舌糜爛疳惡口瘡

大青葉

升麻

大黃

剉炒各二兩

生地黃

切焙三兩

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服微利

止

升麻散

治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍藥

人參

洗

桔梗

去蘗

乾葛

各一兩

甘草

生用半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

瀉黃飲子 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼 去白 炒 黃芩 防風 去蘆 半

夏 湯洗 七次 石斛 各一兩 甘草 生用 半兩

右吹咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘

時候

瀉黃散 治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩

唇口乾燥壅滯不食

藿香葉 七錢 石膏 煨 縮砂仁 山梔子仁 甘

草

炙各
半兩

防風

去蘆
四兩

右剉碎用蜜酒炒香焙為細末每服三錢水一大盞

煎至七分溫服不拘時候

利膈湯 治上膈壅熱口苦咽乾痰唾稠粘心煩喜冷
咽喉生瘡疼痛一切上壅之證皆可服之

防風

雞蘇葉

桔梗

牛蒡子

荊芥穗

各一
兩

川升麻

人參

甘草

炙各
半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

橄欖散 治唇緊燥裂生瘡

橄欖

不拘多少燒灰

右為細末以豬脂和塗患處

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌重舌舌腫

或連頰兩邊腫痛

玄參 赤芍藥 升麻 犀角鎔 桔梗去蘆 貫

眾洗

黃芩 甘草炙各等分

右呔咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

杏仁膏 治口舌熱乾燥或舌上生胎語言不真

升麻

杏仁

去皮尖

甘草

炙各一兩

黑豆

五十粒炒去皮

右為細末入白蜜五合生地黃汁五合慢火熬成膏
子丸如雞荳大常噙一九津化嚥下舌上生胎止用
生薑片蘸冷水擦洗之亦妙

齒

論曰夫齒乃骨之餘氣骨乃腎之所主呼吸之戶門也
精氣強則齒自堅腎氣衰則齒自豁且手陽明大腸之
脉入於齒灌注於牙儻風寒壅熱之氣鬱滯心胃衝發
於口則齒為之病矣輕者為宣露齲頰浮腫甚則為疳
齲脫之證也亦有腎氣虛壅齒痛宣露當進補腎藥
其諸隨證施以治法

安腎丸 治虛熱牙齒浮腫疼痛

肉蓯蓉

酒浸焙

石斛

去根

桃仁

熬炒

破故紙

炒

白朮

乾山藥

劉炒

白蒺藜

炒去刺

川烏

炮去皮臍

川草薢

川巴戟

去心各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十九空心鹽

湯下

莽草散

治風壅熱氣上攻齒齬浮腫或連頰車疼痛

或宣露血出

莽草

川升麻

柳枝

槐角子

鶴虱

地骨

皮

藁本

去蘆

槐白皮

右咬咀每服一兩水一盞入鹽少許煎至七分去滓
熱含冷吐之日用三次

必勝散 治齒衄

蒲黃 畧炒 螺兒青 等分

右為細末每用少許擦患處少待用湯鹽水漱之

驅毒飲 治熱毒上攻宣露血出齒齦腫痛不可忍者

屋遊 即无屋上青苔不拘多少洗淨

右煎湯澄清入鹽一小撮放溫頻頻漱之

牢牙散 治一切齒痛不問久新

全蝎

七個
去毒

細辛

洗淨
三錢

草烏

二個
去皮

乳香

別研
二錢

右為細末每用少許擦患處須臾以溫鹽水盥漱

香鹽散 此藥常用牢牙去風冷蛀齧宣露一切齒疾


大香附子

炒令極
黑三兩

青鹽

半兩
別研

右為細末和勻用如常法乃鐵甕先生良方也



欽定四庫全書

子部
濟生方卷八
六至

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

膳錄貢生臣黃琮

膳錄監生臣單可圭

欽定四庫全書

濟生方卷六

宋 嚴用和 編

血氣

論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒憂思悲恐驚者七氣也七情之外益之以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身血隨氣行氣一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事將行預先作痛或月

事已行淋瀝不斷心腹作痛或連腰脇或引背脊上下
攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作寒熱或
為癥瘕肌肉消瘦非特不能受孕久而不治轉而為瘵
疾者多矣

延胡索湯 治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心
腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搐搦經候
不調但是一切血氣疼痛並可服之

當歸

去蘆酒
浸到炒

延胡索

炒去
皮

蒲黃

炒

赤芍藥

官桂

不見火
各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木

香

不見火
各三錢

甘草

炙二
錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去

滓食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散

治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹疔痛

不可忍及惡露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹

痛並皆治之

牡丹皮

去木

赤芍藥

蓬莪朮

剉

荊三稜

剉

劉寄奴

去梗

熟地黄

酒浸蒸

延胡索

炒去皮

當歸

去蘆酒浸

烏藥

官桂

不見火各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空心食前溫酒調服

三神丸 治婦女血氣相搏腹中刺痛引心端經行

澀少或經事不調以致疼痛

橘紅

二兩

延胡索

去皮醋煮一兩

當歸

去蘆酒浸剉炒一兩

右為細末酒煮米糊為丸如桐子大每服七十九加至一百丸空心艾湯下米飲亦得

抑氣散 治婦人氣盛于血變生諸證頭暈膈滿皆可服之

香附子

炒淨
四兩

茯神

去木
一兩

橘紅

二兩

甘草

炙一兩

右為末每服二錢食前用沸湯調服

帶下

論曰巢氏病源論婦人有三十六疾所論三十六疾者

七癥八瘕九痛十二帶下是也然所謂十二帶下者亦不顯其證狀今人所患惟赤白二帶而已推其所自勞傷過度衝任虛損風冷據於胞絡此病所由生也且婦人平居之時血欲常多氣欲常少方謂主氣有原百疾不生儻或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交併則赤白俱下有室女或虛損而有此疾者皆令孕育不成以致絕嗣凡有是證速宜治之久而不治令人面色黧黯

肌肉瘦瘠腹脇脹滿攻刺疼痛甚至足脛枯細多苦逆
冷尪羸不能食矣診其脉右手尺脉浮浮為陽陽絕者
無子苦足冷帶下也

白堊丸 治婦人白帶久而不止面生黧黯透臍疼痛
腰膝冷痛日漸虛困產後白帶並宜服之

白堊

火煨

禹餘糧

煨醋淬七次

鼈甲

醋炙

烏賊骨

醋炙

當歸

去蘆酒浸

鵲巢灰

乾薑

炮

紫石英

火煨醋淬七次

附子

炮去皮臍

金毛狗脊

燎去毛

芎藭

各一兩

艾葉

灰

半兩

鹿茸

療去毛切片
醋炙一兩

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十九空心溫酒米飲任下

白斂圓

治室女衝任虛寒帶下純白

鹿茸

醋蒸焙
二兩

白斂

金毛狗脊

療去毛
各一兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸如桐子大每服五十丸空心溫酒下

當歸煎 治婦人室女赤白不止腹內疼痛四肢煩疼

不欲飲食日漸羸瘦

當歸

去蘆酒浸

赤芍藥

牡蠣

大煨取分

熟地黄

酒焙蒸

阿膠

剉蛤粉炒成珠子

白芍藥

續斷

酒浸各一兩

地榆

半兩

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五十丸空心米飲下

卷栢丸

治婦人室女腹臟冷熱相攻心腹絞痛腰痛

腿痛赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

黃耆

去蘆蜜水炙

熟地黃

洗各一兩半

卷栢

炙醋

赤石

脂

煨醋淬七次

鹿茸

炙醋

白石脂

芎藭

代赭石

煨醋淬七次

艾葉

炙醋

桑寄生

鼈甲

炙醋

當歸

去蘆

酒洗微炒

地榆

各一兩

木香

不見火

龍骨

各半兩

乾

薑

炮三分

右為末醋煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九空

心食前米飲下

血瘕

論曰腹中之病經書所載有積有聚有癖有疝有癥有
瘕蓋積者五藏所積其痛不離其部聚者六腑所聚其
痛無有常處癖者病據兩脇之傍疝者弦急而多痛癥
者徵也有塊可驗瘕者假也假物成形其結聚浮假推
移乃動此無他皆由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟
腑虛弱受于風冷與氣血相結而成也惟婦人血瘕為
病異於丈夫其所以異者非獨關於飲食不節而已多
因產後勞動太早喜怒不調臟虛受寒或月水往來取

涼過度惡血不散遇寒搏則凝皆能成血瘕也病作之時令人心脇攻刺少腹痛重或腰背互相引而痛久而不消令人黃瘦羸弱遂致絕產診其脉弦急大者生虛小弱者死不治

三稜煎丸 治婦人室女血瘕月經不通臍下堅結大如杯升而不治必成血蠱

京三稜

蓬朮

各二兩

芫花

半兩

青皮

去穢淨一兩半

右剉如豆大用好醋一升煮乾焙為細末醋糊為丸

如桐子大每服五十丸食前用淡醋湯下

琥珀丸 治婦人血瘀腹中有塊攻刺小腹痛重或腰

背相引而痛久而不治黃瘦羸乏

琥珀

別研

白芍藥

川烏

炮去皮

川牛膝

去蘆酒浸

鼈甲

醋炙

蓬莪茂

炮

當歸

去蘆酒浸

厚朴

薑製炒各一兩

木香

不見火

澤蘭葉

官桂

不見火各半兩

麝香

別研半錢

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心溫

酒米飲任下

通經丸 治室女月經不通臍下堅結大如杯發則寒熱往來此名血瘕

當歸

去蘆酒浸一錢半

蓬朮

地

桂心

不見火

青皮

去白

大黃

炮

乾薑

地

桃仁

去皮尖炒

乾漆

炒令烟盡

紅

花

川椒

去目及閉口者微炒故地上密蓋出汗各一錢

右十味為末將一半用醋煮熬成膏一半入雞子清

同搗勻丸如桐子大每服二十九空心淡醋湯下

六合湯 治婦室經事不行腹中結塊疼痛腰痛腿痛

當歸

去蘆酒浸

白芍藥

官桂

去皮

熟地黃

川芎

蓬朮

炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫空心服

崩漏

論曰崩漏之疾本乎一證輕者謂之漏下甚者謂之崩中且婦人平居經脉調適衝任二脉互相滋養陰陽二氣不相偏勝則月事以時下儻若將理失宜喜怒不節疲極過度大傷於肝蓋肝為血之府庫喜怒勞役一或

傷之肝不能藏血于宮宮不能傳血于海所以崩中漏下漏下者淋瀝不斷是也崩中者忽然暴下乃漏證之甚者其狀或如豚肝或成五色與血俱下又或如泔涕如爛瓜汁又或如豆羹汁如藍靛色至有黑如乾血相雜亦有純下瘀血此皆衝任虛損喜怒勞役之過致傷于肝而然也久久不止面黃肌瘦虛煩口乾臍腹冷痛吐逆不食四肢虛困甚則為脹為腫診其脉寸口脉弦而大弦則為減大則為乳減則為寒乳則為虛虛寒相

搏其脉為革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉
浮者不可治治之之法調養衝任鎮注血海血海溫和
歸于有用內養百脉外為月事自無崩中漏下之患矣
又論曰崩漏之疾本乎一證然有輕重之別焉輕者為
之漏下漏下者淋瀝不斷是也重者謂之崩中忽然暴
下下而過多真陰走耗遂致頭暈眼花氣乏怔忡身體
羸瘦飲食減少腹內冷痛四肢無力驚惕恐怖此其證
也前方論治有對證服之而作効者亦有試之而罔功

者非藥之不應乃由衝任極虛血海極寒故爾蓋血暖則流暢外為月事內灌百脉今既虛極而又寒極血寒則凝而不運是以崩中不已狀如豚肝或下五色或與血俱下或如泔涕或如豆羹汁或如藍靛色或純下瘀血此血寒之極所致若謂血熱致崩而用涼藥誤矣每用歲丹作效始進三五粒而未愈再進十粒猶未愈服至四五十粒差愈服至百粒方能作効此歲丹之力也然歲丹之性全恃火力如水寒成冰血寒成塊血得溫

則流散四肢冰得日則烘消成水血凝得丹而流暢火
之力也大抵醫者意也以意醫之所以作效儻或疑而
未敢輕用先進陽起石丸服之二日未効却進歲丹庶
無可疑矣又有室女二七天癸當至亦有當至而未至
者近十八九左右方行者有卒然暴下亦有淋瀝不止
有若崩漏者却又不宜服前二藥也惟當以四物湯加
香附子煎血色鮮而不止者挾熱也宜去熟地黃加生
地黃煎臨病之際又在乎審處之

鎮宮丸 治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定或如豆汁或狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久久不止令人黃瘦口乾胸煩不食

代赭石

火煨醋淬七次

紫石英

火煨醋淬七次

禹餘糧

火煨醋淬

七次

香附子

醋炙各二兩

陽起石

煨紅細研

芎藭

鹿

茸

燎去毛醋蒸焙

茯神

去木

阿膠

剉蛤粉炒成珠子

蒲黃

炒

當歸

去蘆酒浸各一兩

血竭

別研半兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米和丸如桐子大每服

七十丸空心米飲下

十灰丸 治崩中下血不止

綿灰 黃絹灰 艾葉灰 馬尾灰 藕節灰

蓮蓬灰 油髮灰 赤松皮灰 椶櫚灰 蒲黃

灰

右等分為細末用醋煮糯米糊為丸如桐子大每服七十丸加至一百丸空心米飲下

栢子仁湯 治婦人憂思過度勞傷心經心主于血心

虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸

去蘆酒炒

芍藥

茯神

去木

小草

阿膠

剉粉炒

成珠

鹿茸

燎去毛酒蒸焙

栢子仁

炒各一兩

香附子

炒去

子

毛二兩

川續斷

酒浸一兩半

甘草

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

空心食前溫服

陽起石丸 治衝任不交虛寒之極崩中不止變生他

證

陽起石

大煨紅別研
令極細二兩

鹿茸

去毛醋
炙一兩

右為細末醋煎艾汁打糯米糊為丸如桐子大每服
百丸空心食前米飲下

加減四物湯 治室女二七天癸至亦有當時未至而
後至者有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多
變生諸證悉宜服之

川當歸

去蘆酒潤
切焙一兩

川芎

一兩

熟地黄

洗淨
一兩

白

芍藥

一兩

香附子

炒去毛
一兩半

右呔咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓食前溫服如血色鮮而不止者去熟地黃加生地黃煎

搐搦

論曰婦人室女有生平無病者一旦忽感手足搐搦之證痰涎壅塞精神昏憤不省人事醫者往往便作癇證治之非也蓋婦女以肝氣為主肝乃血之府庫肝既受病經候愆期或多或少或閉斷不通肝宮壅塞隨其虛

實而生病焉婦人多由血虛七情感而生風女子血實
七情感而生熱邪乘四末是以卒然手足搐搦狀類癇
證也治療之法先宜多進蘇合香丸溫酒化服以快其
氣俟其甦醒亟用調經之法塞者通之通者調之虛者
與之實者取之婦人宜服白薇丸女子宜服澤蘭丸多
服以病退為期也

白薇丸

白薇 紫石英

大煨醋
淬七次

琥珀

別研

白芍藥

桂

心

火 不見

川續斷

酒 浸

防風

去 蘆

山茱萸

肉 取

當

歸

去 蘆
酒 浸

栢子仁

炒

川烏

炮 去
皮 尖

牡丹皮

去 木
各 一

兩

木香

不 見 火
半 兩

麝香

別 研
半 錢

右為細末生薑自然汁打米糊為丸如桐子大每服
七十九空心食前溫酒米飲任下

澤蘭丸

當歸

去 蘆
酒 浸

澤蘭葉

琥珀

別 研

羚羊角

鎔 別
研

防風

去 蘆

牡丹皮

去 木 各
一 兩

麝香

別 研
半 錢

安息香

酒煮去滓

砂石半錢

生地黃

赤芍藥

各兩半

鐵粉

半兩

橘

紅錢五

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十九空心食
前溫酒米飲任下

欽定四庫全書

卷六

欽定四庫全書

濟生方卷七

宋 嚴用和 編

求子

論曰素問云夫天地者萬物之父母也陰陽者血氣之男女也夫有夫婦則有父子婚姻之後則有生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血先至陽精後衝血開裏精陰外陽內陰含陽胎而男形成矣陽精先至陰血後參精開裏血陽外陰內陽含陰胎而女形

成矣男女婚姻貴乎及時夫婦貴乎強壯則易於受形也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理或男子真精氣不濃婦女血衰而氣旺是謂夫病婦疹皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽和平則婦人樂有子矣

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿體痛怔忡皆可服之香附子乃婦人之仙藥不可謂其

耗氣而勿服

釋繼洪澹寮方云大槩婦人只宜血盛氣衰所以醫家多為抑陽助陰陽氣陰血

香附子

炒杵淨四兩

茯神

去木

甘草

炙各一兩

橘紅

二兩

右為細末每服二錢食前用沸湯服仍兼進紫石英丸

陽起石丸

治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子

陽起石

火煨紅研極細

鹿茸

酒蒸焙

韭子

炒

兔絲子

水淘淨酒浸蒸焙別研細末

天雄

炮去皮

肉蓯蓉

酒浸各一兩

覆盆子

酒浸

石斛

去根

桑寄生

沉香

別研

原蠶蛾

酒炙

五味子

各半兩

右為細末酒煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九

空心鹽湯鹽酒任下

妊娠

論曰內經云陰搏陽別謂之有子三部脉浮沉正等無病者乃知有娠也妊娠既受矣多病惡阻惡阻者俗諺所謂惡食是也此由婦人本虛平時喜怒不節當風取冷中脫宿有痰飲受妊經血既閉飲血相搏氣不宣通遂

致心下憤悶頭暈眼花四肢沉重懈怠惡聞食氣喜食
鹹酸多卧少起甚則吐逆不自勝持理療之法順氣理
血豁痰導水然後安平矣

又論曰妊娠四月六月多苦煩悶按醫經四月受少陰
君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣又有不定
拘此兩月而苦煩悶者由母將理失宜七情傷感心驚
膽怯而然也

論曰懷妊十月形體就成八月合進瘦胎易產之藥今

世多用枳殼散非為不是若胎氣肥實可以服之况枳殼大能瘦胎胎氣本怯豈宜又瘦之也不若進救生散

安胎益氣令子緊小無病易產又且多少穩當

安胎和氣散

訶子

麩裹煨
去核

白朮

各一兩

陳皮

去白

高良薑

剉炒

木香

不見火

白芍藥

陳米

炒

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去

滓溫服不拘時候忌生冷物

杜仲丸 治妊娠三兩月胎動不安者可預服養胎

杜仲

去皮剉薑汁浸炒去絲

川續斷

酒浸各一兩

右為細末棗肉煮爛杵和為丸如桐子大每服七十丸空心米飲下日二服

如聖散 治胎動腹痛者何蓋胎動腹痛其理不一或緣飲食冷熱動風毒物或因再交搖動骨節傷犯胞胎其候多嘔氣不調和或服熱藥太過氣血相半急服順氣安胎不然變成漏胎則難安矣

鯉魚皮

當歸

去蘆酒浸

熟地黄

酒蒸

阿膠

剉蛤粉炒成珠子

白芍藥

川芎

川續斷

酒浸

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半入芎根少許生薑五片煎至七分去滓空心食前溫服

旋覆半夏湯

治妊娠惡阻心下憤悶吐逆不食惡聞

食氣頭暈四肢百節煩痛多卧少起

旋覆花

去枝萼

芎藭

細辛

洗去土

人參

甘草

炙半兩

半夏

湯泡七次

赤茯苓

去皮

乾生薑

陳皮去白各一兩

當歸去蘆酒浸一兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

人參半夏丸 治妊娠惡阻病醋心胃中冷腹痛吐逆不喜飲食

半夏泡七次

人參 乾生薑各半兩

右為細末以生地黃汁浸蒸餅為丸如桐子大每服四十丸米飲下不拘時候

縮砂散 治妊娠胃虛氣逆嘔吐不食

縮砂仁 不拘多少

右為細末每服二錢入生薑自然汁少許沸湯點服
不拘時候

百合散 治妊娠風熱相交欬嗽痰多心胃滿悶

百合 蒸 紫菀茸 洗 貝母 去心 白芍藥 前胡

赤茯苓 去皮 桔梗 去蘆炒 甘草 炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

消風散 治證同前

石膏

煨

甘菊花

去枝梗

防風

去蘆

荆芥穗

川羌活

去蘆

羚羊角

鎊

川芎

大豆黃卷

炒

當歸

去蘆酒洗

白芷

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半入好茶半錢煎至八分

去滓通口服食後良

芎蘇散

治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋者何

蓋因風寒客於皮膚傷於榮衛或洗項背或當風取涼致令頭目昏痛增寒發熱甚至心胃煩悶大抵產前二命所係不可輕易妄投湯劑感冒之初止宜進芎蘇散以發散表邪其病自愈

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮 麥門冬去心

陳皮去白 乾葛各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片蔥白二寸煎至八分去滓溫服不拘時候

驅邪散 治妊娠瘧疾蓋榮衛虛弱脾胃不足或感風

寒或傷生冷傳成瘧疾急服驅邪散莫待吐逆見物不

思卒難醫療

高良薑

剉炒

白朮

草薢仁

橘紅

藿香葉

縮砂仁

白茯苓

去皮各一兩

甘草

炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至八分去滓溫服不拘時候

冬葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及

水腫

冬葵子三錢

赤茯苓

去皮二錢

右為細末每服三錢米飲調服不拘時候利則住服如不通恐是轉胞加髮灰少許神效

麥門冬湯

治子煩

阮霖經驗良方云治妊娠心驚膽怯煩悶

麥門冬

心去

防風

白茯苓

去皮各一兩

人參

半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片入淡竹葉十片煎至八分去滓溫服不拘時候

羚羊角散

治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語蹇

澀痰涎不消或發搐搦不省人事名曰子癇亦宜服之
阮霖經驗良方云心支之女患此正是雪寒之時用此效

羚羊角

鎔

川獨活

去蘆

酸棗仁

炒去殼

五加皮

去木各半錢

薏苡仁

炒

防風

去蘆

當歸

去蘆酒浸

川芎

茯神

杏仁

去皮尖各四分

木香

不見火

甘草

炙各二分半

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時候

產後

論缺

芎歸湯 治大產小產對證加添服餌

芎窮

當歸

去蘆酒浸

右等分咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾薑白芍藥水停心下微嘔逆加茯苓生薑虛煩不得眠加人參竹葉大便秘澀加熟

地黃橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹加厚
朴血崩不止加香附子欬嗽痰多加紫菀半夏生薑
腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加延胡索惡血不下腰
腹重痛加牡丹皮

芎藭補中湯 養新血去瘀血補虛扶危

乾薑

炮

阿膠

剉蛤粉炒

芎藭 五味子

各一兩

黃耆

去蘆蜜水炙

當歸

去蘆酒浸

白朮

赤芍藥

各一兩

木香

不見火

人參

杜仲

去皮剉炒

甘草

炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓通口服
不拘時

豬腰子粥

治產後羸勞發熱

豬腰子一隻去白膜切作柳葉片少鹽酒拌之先用
粳米一合入蔥椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盞底用
熱粥蓋之如作盒生粥狀喫之每日空心作粥極妙
金液丸 治將產忽見橫倒者蓋不能忌口恣情多食
五臟氣滯六腑不和胎氣既肥則用力太早胎受驚觸

急用瘦胎金液丸其兒身自順生矣

飛生毛

火燒如腋下
毛尤佳半錢

血餘

無病女人
髮燒炭

公母羊糞

燒灰各
半錢

竈中心土

一錢

黑鉛

三錢用小銚子火上鎔投水銀
半錢急攪成砂子傾出細研

硃砂

半錢
別研

右為細末用粽子角為丸如菉豆大遇難產急難以
倒流水吞下五九兒身自順正產子母活矣

抵勝湯

治胃受水穀脾主運化生血生氣內濡腑臟

者也因產腑臟暴虛惡露下少敗血乘虛散於脾胃脾

受之而腹脹胃受之則成吐逆亦有惡露過多氣無所主聚於脾胃脾受之則為腹脹胃受之則吐逆惡露過多者去澤蘭赤芍藥倍加生薑橘皮

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮

各一分

甘草

一錢

右以咀每服一劑用水一碗生薑焙乾半兩煎至半碗去滓分三服

產後中風

論曰產後中風者蓋因產後傷動血氣勞損經絡腠理
空疎勞役太早風邪乘間而入始則客於皮膚次則入
於筋脉又其次也傳於諸臟隨其諸臟經絡而生病焉
或身體緩急或頑痺不仁或口目不正或奄奄忽忽神
情昏亂乃中風候宜服小續命湯

阮霖經驗良方凡產後氣血暴虛未得安

靜血隨氣上迷亂心神氣息欲絕

暈悶不知人口噤手足痲痺醫者不識呼為暗風誠為謬矣

小續命湯

治婦人產後失血中風冒昧不知痛處拘

急不得轉側四肢緩急遺失便利

麻黃

去根節煎
掠去沫焙

桂

去粗皮

甘草

炙各二兩

人參

白朮

附子

炮去皮臍

防己

芍藥

黃芩

去黑心各一兩

防風

一兩半

右剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入生薑三片煎取七分去滓溫服

產後血崩

方缺

論曰產後血崩者蓋因產所下過多血氣暴虛未得平復或因勞役或因驚怒致血暴崩又有榮衛虛傷氣衰

血弱亦變崩中若小腹滿痛此為肝經已壞為難治若
小腹脹滿此為內有瘀血未可止之止之非特淋瀝不
已小腹轉加脹滿若小腹脹滿且復芤芩湯及黑龍丹
若小腹不滿急是內無瘀血可服固經丸止之惡熱藥
者進十灰丸亦得

欽定四庫全書

卷七

欽定四庫全書

濟生方卷八

宋 嚴用和 編

丁瘡

附熱瘡

論曰諸瘡莫急於丁瘡有魚眼丁多發於足非神手不能治也大凡治丁瘡先以披頭針當頭刺之直至患者知痛處纔引針而出血隨之流則以蟾酥追毒丹納針孔中仍以紙撚送下使近痛處其上封以乳香膏四膀腫處敷以烏龍膏或有赤暈敷以解毒散並如前法三

兩日瘡潰拔去仍覆以乳香膏膿盡生肌並如前法

嵇云有絲瘡證乃丁瘡之類醫若不識便無治法害人最速其瘡生手足間有黃泡其中或紫黑色即有一條紅絲迤邐向上而生若至心腹則使昏亂不救其紅絲或有生三兩條者治法以針橫截紅絲所至之處刺之止使血出以膏藥傅之更不復發動即愈矣此證得於喜怒不節血氣逆行而生內翰洪舜俞以惡瘡生齧上久不能治嵇云此名內疳瘡初發如蓮花痔根蒂小而

下垂反大治法以勾刀決斷其根燒鐵器令七八赤烙之以止血次以雄黃輕粉粉霜香白芷白斂為散敷其上令病人側卧以槐枝作枕支其牙頰間毋使口合一兩時許瘡癰定令病者自便治日得膿便可漸愈若此證久不治即四邊肉漸成死肌法用槐枝枕支病者牙毋使得合以小鎌去其惡肉令盡即撒生肌散上仍用乳香膏護之自非飲食時且令病者側卧支其牙頰毋使口合則津液不衝動瘡藥三日後肌肉漸生纔可令

病人自便無所礙矣洪內翰云此證緣醫家不識則無
治法以至不救良可惜也此證得之作勞氣血虛憊所
至治驗

嵇云治魚眼丁之法先以鍼刺之若痛則瘡根已走矣
用療漏瘡之法以榆皮隨俞穴所往探之榆所不及之
處則針破引榆皮而出再自針穴尋之若鍼破處病人
自痛血出則是活肌肉矣即于鍼瘡納蟾酥丹覆以乳
香膏再於瘡鍼孔中納蟾酥丹三二粒仍覆以乳香

二黃散 治丁腫

雄黃

雌黃

各等分

右為末先用鍼刺四圍及中心醋和塗之

蟾酥丹

蟾酥

一枚

右為末以白麵和黃丹丸如麥顆狀鍼破患處以一

粒內之神妙

灸法 治丁腫灸掌後橫紋五指男左女右七壯即瘥

已用得效丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於意表也
考嵇治法金大定間有遇異人傳狗寶丹丸得之者以
獻偽主其後嵇事偽朝以外科奉御療將士金瘡有功
金主以金帛賜焉嵇治瘡凡癰疽丁漏惡瘡皆先以狗
寶丸為第一義先投狗寶丸半時次投熱葱粥以助之
厚被蓋覆病者使汗出周浹則毒勢隨汗而解若汗不
出則不可療矣汗罷則瘡之陷者必起散者必聚次以
烏龍膏傅其腫若腫之外有赤暈者則以解毒散傅之

凡傳藥必先自外向裏塗之看正瘡大小凡正瘡之上並不許加分毫藥每日隨證服五香連翹湯十奇散棗豆粉等藥大率以狗寶丸為先以烏龍膏解毒散次之而服餌之藥則隨脉氣陰陽虛實而用之空心必服加減八味丸以助元氣俟瘡潰以針決去敗膿訖然後以乳香膏傳正瘡之上若尚有未盡膿則於膏藥當中直翦一路以通膿水膿欲盡以生肌散敷瘡口仍以乳香膏覆之更不須翦破膏藥乳香膏一日一換俟瘡口欲

合即便不加膏藥矣烏龍膏之功在於消腫解毒散之功在於收暈即不用解毒散而烏龍膏直俟瘡潰敗膿出盡然後已此其大畧也癰疽之證甚惡多陷下透骨者服狗寶丸瘡四邊必起依前法用烏龍膏解毒散訖須用針刀開瘡孔其內已潰爛不復知痛乃納追毒丹於孔中以速其潰既潰後割去死肌洗以豬蹄湯敷以生肌散覆以乳香膏又傳之善角散以醋熬為糊貼之惡肉退去好肉漸生即用搜膿散翠霞散之類祛之若

瘡中毒氣未盡慎勿早斂忌早上生肌之藥縱復平復必再發其間調理次第臨時制宜將護須慎之

狗寶丸 專治癰疽發背附骨疽諸般惡瘡

狗寶

一兩生用癰狗腹中得之

蟾酥

二錢

乳香

別研

沒藥

別研

雄黃

硃砂

輕粉

麝香

鉛白霜

粉霜

別研各一錢

金頭蜈蚣

七箇頭尾脚足炙黃色研如泥

烏金石

即石灰袁州萍鄉縣有之二錢重

鯉魚膽

七箇乾者用之去皮臘月者尤佳

狗膽

一箇乾者用之去皮
黑狗者臘月者好

頭胎孩兒乳

合

黃蠟

三錢

右先將頭胎兒乳黃蠟放在鉢內文武火化開用前藥末和成劑放在甕器內要用旋丸如麻子大兩丸如病大三丸用白丁香七箇直者為妙以新汲水化開送下狗寶丸腰以下病食前服腰以上病食後服如人行三里用熟葱白粥投之即以衣被蓋定汗出為度已後只喫瓜虀白粥常服十奇散留頭四邊以

烏龍膏貼之

追毒丹 治疽瘡黑陷者先用狗寶丸治次以烏龍膏

收腫散毒去赤暈乃用針刀開瘡納追毒丹使之潰然
後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆

七粒去皮心不去油研如泥

白丁香

錢一

雄黃

黃丹

各二錢

輕粉

錢一

加蟾酥尤神速

右件研和加白麵三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納
之上覆以乳香追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去

不可治亦以此法追毒去死肌乃養肉斯愈矣疾小者用一粒大者加粒數用之

解毒散 去熱腫取赤暈

寒水石

二兩

龍骨

半兩

黃連

去鬚

黃蘗

各一兩

輕粉

一錢

右為細末和雞子清調以雞羽掃瘡上若是熱瘡加黃丹半兩

烏龍膏 治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子

去殼

半夏

各一兩

小粉

四兩

草烏

半兩

右於鐵銚內慢火炒令焦為細末出火毒再碾細以冷水調敷一日一換

紅膏藥

治軟癰及惡瘡風濕所搏渾身疼痛

瀝青

白膠香

各二錢

黃蠟

右於銚內煎化量用麻油三錢許煎濾於水盆中揉成劑收之每用於水內捻作餅子隨瘡大小貼之上傳以紙此藥加當歸一兩於內煎令黃色濾去滓於

水盆內取出藥揉成劑再加乳香末二錢和為乳香膏尤佳其加青黛者即名清金膏其加黃丹者即名紫金膏皆貨藥者誑人之術其功用一而已矣

生肌散

寒水石

錢二

黃丹

錢半

龍骨

錢七

輕粉

錢一

右為細末乾傅上貼以乳香膏

竹茹膏

治黃泡熱瘡

真麻油

二兩

青木香

二兩

青竹茹

一小團

杏仁二七粒
去皮尖

右藥入麻油內慢火煎令杏仁黃色去滓入松脂研半兩熬成膏每用少許擦瘡上

治頭瘡及諸熱瘡

先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裏乾後用百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

肺癰

論曰夫肺癰者由風寒之氣內舍於肺其氣結聚所成

也蓋肺為五藏之華蓋其位象天候於皮毛氣之所主
將理失宜勞傷氣血風寒得以乘之蓋寒則生熱風極
亦生熱壅積不散遂成肺癰矣肺癰之狀寸口脉數而
實欬而胃內滿噎噎痛兩肘腫滿咽乾口燥煩悶多渴
時出濁唾腥臭久久吐膿狀如粳米粥者難治有膿而
嘔者不可治嘔膿而止者自愈凡病肺癰脉來短濇者
順浮大者死其色當白而多赤者亦死

桔梗湯

治肺癰心胃氣壅欬嗽膿血心神煩悶咽乾

多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澀

桔梗

去蘆

貝母

去心膜

當歸

去蘆酒浸

蘇蘇子

枳殼

去瓢麩炒

薏苡仁

炒

桑白皮

蜜水炙

防己

各一兩

甘草節

生用

杏仁

去皮尖麩炒

百合

各半兩

黃耆

去蘆一兩半

右呔咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓溫服不拘時候若大便秘者加大黃小便秘者加

木通

痔

論曰痔凡有五即牡痔牝痔腸痔脉痔血痔是也素問云因而飽食筋脉橫解腸澼為痔多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩久坐濕地情慾耽著久忍大便遂使陰陽不和關格壅塞風熱下衝乃成五痔肛門生妒或左或右或內或外或狀如鼠竅或形似櫻桃或膿或血或痒或痛或軟或硬或聾或腫久而不治則成漏矣治之之法切不可妄用毒藥亦不可輕易割取多致淹滯惟

用穩重湯劑徐徐取效不可不知

黃耆丸 治五痔出血疼痛

槭藤子

煨用肉半兩

川續斷

酒浸

黃耆

去蘆

貫衆

附子

炮去皮臍

黃礬

別研

刺蝟皮

燒灰

當歸

去蘆酒浸

阿膠

蛤粉炒各一兩

麝香

別研一字

右為細末米糊為丸如桐子大每服七十九空心米飲下氣壯多熱之人不宜服此

斷紅丸

治陽虛臟腑久而腸風痔疾下血不止或所

下太多面色萎黃日漸羸瘦

側柏葉

微炒黃

川續斷酒浸

鹿茸

燎去毛酒煮

附子

炮去皮臍

黃耆

去蘆

阿膠

剉蛤粉炒成珠子

當歸

去蘆酒浸各一兩

白礬

枯半兩

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十九空心食前米飲下

蝸牛膏 敷痔有效

蝸牛

一枚

麝香

三分

右用小砂合子盛蝸牛以麝香摻之次早取汁塗痔處

枯礬散 治五痔痒多痛少或膿或脹或漏血不止

白礬

枯半錢

腦子

一字別研

右為末先用魚腥草煎湯放溫洗痔次用藥少許摻患處

蛻皮丸 治五種痔漏

豬左足懸蹄

燒灰存性

蛻皮

一枚燒灰存性

黃牛角腮

燒灰存性

貫衆

槐角子

炒

雷九

雞冠花

槐花

炒

油髮灰

黃耆

去蘆

香白芷

當歸

去蘆酒浸

枳殼

去瓢生用

玄參

黃連

去鬚

防風

去蘆

鼈甲

醋煮各半兩

麝香

別研半錢

右為細末米糊為丸如桐子大每服七十九加至一百丸空心米飲下年高虛弱寒濕痔疾不宜服之

瘻

嵇云澄江治一婦人漏瘡此婦人先於小腹下成一漏

瘡久又於背脊腰下成一瘡嵇以榆枝自背探之乃直達於腹前之漏瘡乃兩用追毒丹乳香膏烏龍膏而愈嵇云癰之根脚淺而濶僅治之遲則有潰爛肌肉之患若久而不合則多為漏瘡治癰已具於前

嵇云漏瘡當探其深淺渠在北地時有一人害漏瘡於脇間嵇以榆皮細枝刮去皮取線以綿裹其尖以線牢繫之以榆皮探瘡中之穴乃自脇而達於腰在皮膚之間遂於病者腰間以針決破用追毒丹三粒納於瘡中

三日即潰而脇間之漏遂止其膿悉自腰間針孔中出膿盡生肌散愈其服狗寶丸數烏龍膏乳香膏生肌散並如前法

疥

論曰夫疥瘡之為病雖若不害人然亦至難忍矣素問云諸痛痒瘡皆屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方有所謂馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至遍體或痛或癢或腫或皮

肉隱嶙或抓之凸起或痞癰或膿水浸淫治之內則當理心血祛散風熱外則加以敷洗理無不愈

當歸引子 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或腫或痒或膿水浸淫或發赤疹痞癰

當歸

去蘆

白芍藥

川芎

各一兩

生地黃

洗

白蒺藜

炒去尖

防風

去蘆

荆芥穗

各一兩

何首烏

黃耆

去蘆

甘草

炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

神異膏 治一切瘡疥

全蝎

七箇
去毒

皂角

一錢
剉碎

巴豆

七箇
去殼

蛇床末 三錢

麻油

一兩

黃蠟

半兩

輕粉

半字

雄黃

別研
三錢

右先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化開取出冷處入雄黃蛇床末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗以藥擦瘡疥上

苦參湯

苦參 蛇床子 白礬 荊芥穗

各等分

右四味煎湯放溫洗

癬

論曰夫癬之為病種狀不同古方有所謂乾癬風癬苔癬之類癰疹如錢漸漸滋蔓或痒或痛或圓或斜其中生蟲搔之有汁此有風濕毒氣與血相搏凝滯而為此疾也

胡粉散 治一切癬神效

胡粉

一分

硃

半

硫黃

別研一分

斑貓

一枝

麝香

少許

蝎梢

七枚

雄黃

別研一分

大草烏

一箇生用

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

癰瘤

論曰夫癰瘤者多由喜怒不節憂思過度而成斯疾焉大抵人之氣血循環一身常欲無滯留之患調攝失宜氣凝血滯為癰為瘤癰者多結於頸項之間瘤者隨氣

凝結於皮肉之中忽然腫起狀如梅李子久則滋長醫
經所謂癭有五種瘤有六證五癭者石癭肉癭筋癭血
癭氣癭是也六瘤者骨瘤脂瘤膿瘤血瘤石瘤肉瘤是
也治療之法五癭不可決破破則膿血崩潰多致夭枉
六瘤者脂瘤可破去脂粉則愈外五證亦不可輕易決
潰慎之慎之

破結散 治石癭氣癭筋癭血癭肉癭等證

海藻

洗

龍膽

海蛤

通草

昆布

洗

礬石

枯

松蘿

各三分

麥麴

四分

半夏

二分湯
泡七次

貝母

去心
二分

右為細末酒服方寸匕日三忌甘草鯽魚豬肉五辛

菜諸雜等物

昆布丸 治一切癭瘤不問久新

昆布

洗

海藻

洗

小麥

各一兩好
醋煮乾

右為細末煉蜜為丸如杏核大每服一丸食後噉嚥

瘰癧

論曰夫瘰癧之病即九漏是也古方所載名狀不一難以詳述及其生也多結於項腋之間累累大小無定發作寒熱膿水潰漏肺主虬蟬漏心主蟻螬漏膽主浮蛆漏腎主瘰癧漏小腸主轉脉漏原其所自多因寒暑不調飲食乖節遂致血氣壅結而成

皂子丸 治瘰癧滿項不破及結核腫痛者

好皂角子一升 玄參 連翹仁各一兩

右用水五升砂鍋內慢火煎水盡為度每服揀取好

皂角子軟者三粒食後臨卧時細嚼津下硬者搗爛
蜜和如榛子大含化半月必差忌酒麪熱毒物

三聖丸 治療癰

丁香

五十箇

斑貓

十箇

麝香

一錢別研

右為細末用鹽豉五十粒湯浸研如泥和前藥令勻
丸如菉豆大每服五七丸食前溫酒下日三服如至
五七日外覺小便淋瀝是藥之效便加服或便下如
青筋膜之狀是病之根也忌濕麪魚肉一切動風物

連翹丸 治療癰結核破或未破者

薄荷

新者二觔
裂取汁

好皂角

一挺水浸去皮裂取汁
已上二味同於銀石器

內熬
成膏

青皮

一兩

連翹

半兩

陳皮

一兩不
去白

皂角子

慢火炮去皮取皂子
仁搗羅為末一兩半

黑牽牛

一兩半半
生半炒

右五味為末用前膏子為丸如桐子大每服三十九
煎連翹湯下食後十日見效

金瘡

奪命散 治金瘡打損及從高墜下木石所壓內損瘀

血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蛭

用石灰慢火炒
令焦黃色半兩


大黃

二兩

黑牽牛

二兩

右各為細末每服三錢用熱酒調下如人行四五里
再用熱酒調牽牛末二錢催之須臾臍轉下惡血成
塊或成片惡血盡即愈



欽定四庫全書

濟生方卷五

宋 嚴用和 編

目

論曰人之有雙眸若天之有兩曜五臟六腑之精華宗
脉之所聚周視萬化肝之外候也眼通五臟氣貫五輪
由此觀之人之有生須固養身之道善攝生者養氣存
神安心息視然後心氣通暢肝氣和平精氣上注于目
則目無其疾矣倘將養乖理六淫外傷七情內鬱嗜慾

不節飲食無度生食五辛熱啖炙燂久視勤書憂哀悲
泣皆能病目况方論有八廓内外障等之證茲不復叙
治療之法必須洞明形狀細察根元窮其是非若能細
審無不瘥除然病眼之人不得當風看日喜怒房勞五
辛炙燂酒食毒物並宜斷之惟須寬緩情性慎護調攝
即無不瘥也若縱恣乖違觸犯禁忌自貽其咎必致喪
明而後已可不謹歟

杏連散 治風熱上攻羞明澀痛

黃連

去鬚一錢槌碎

杏仁

七粒槌碎

右用水半盞二藥浸之飯上蒸一時久澄清放溫洗了用紙蓋覆安頓湯瓶上頻頻洗之

補腎丸

治腎氣不足眼目昏暗瞳神不分明漸成內

障

磁石

大煨醋淬七次水飛

兔絲子

淘淨酒浸蒸別研各二兩

五味子

熟地黃

酒蒸焙

枸杞子

楮實子

覆盆子

酒浸

肉蓯蓉

酒浸焙

車前子

酒蒸

石斛

去根各一兩

沉香

研別

青鹽

別研各
半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十九空心鹽

湯下

冷補丸

治腎水燥少不受峻補口乾多渴耳痒耳聾

腰痛腿弱小便赤澀大便或難

熟地黄

酒蒸
焙

生地黄

洗

天門冬

去心

川牛膝

去蘆
浸

白芍藥

地骨皮

去木

白蒺藜

炒

麥門

冬心
去

石斛

去根

玄參

磁石

火煨七次
研水飛過

沉

香

別研不見
火各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下

養肝丸 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力

當歸

去蘆酒浸

車前子

酒蒸焙

防風

去蘆

白芍藥

麴仁

別研

熟地黃

酒蒸焙

川芎

楮實子

各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸溫熱水下不拘時候

羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅胃裏炎

羚羊角

鎔

柴胡

去蘆

黃芩

川當歸

決明子

羌活

去蘆

赤芍藥

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

桑白皮散 治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日
夜疼痛心胃煩悶

玄參

桑白皮

枳殼

去瓢
麩炒

川升麻

杏仁

去皮

尖炒

旋覆花

去皮
梗

防風

去蘆

赤芍藥

黃芩

甘菊花

去枝
梗

甘草

炙

甜葶藶

炒各
一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去

滓食後溫服

爐甘石散

治一切目疾不問得疾之因悉皆治之

爐甘石

半斤用黃連四兩如豆大于銀石
器內煑一伏時去黃連取石研

腦子

別研二

錢半

石件和勻每服半字白湯泡放溫時時洗之

決明子散 治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生翳膜
或皆出努肉或痒或澁羞明多淚或始則昏花漸成內
障但是一切暴風客熱皆宜服之

黃芩

甘菊花

去枝梗

木賊

決明子

石膏

赤芍藥

川芎

川羌活

去蘆

石決明

各一兩

甘

草

蔓荊子

各一兩

右為細末每服三錢水一中盞生薑五片煎至六分

食後服

太清散 治暴風客熱目赤睛痛癰澁難開

銅青

半兩
別研

薑粉米

二錢
半

右藥研細和勻每用少許沸湯泡放溫頻洗之

造薑粉法臘月間用生薑洗切碎於砂盆內搗爛以新麻布裂汁澄脚取粉陰乾

秦皮散 治暴風客熱赤眼腫痛痒澁眵淚昏暗

滑石 秦皮 黃連

去鬚
等分

右為細末每用半錢沸湯泡澄清溫洗不拘時候

後論曰夫眼者內則屬乎五藏外則應乎五藏瞳神黑
水腎之主也血輪如環心之主也絡裏者脾之主也白
睛屬肺總管於肝眼帶雖係於肝明孔通通五藏五藏
皆有神善攝生者調五藏以養神神安則藏和藏和則
眼目清淨自無疾矣凡所感之由與夫治療皆可選而
用之

耳

論曰夫耳者腎之候腎者精之所藏腎氣實則精氣上通聞五音而聰矣若疲勞過度精氣先虛於是乎風寒暑濕得以外入喜怒憂思得以內傷遂致熱壅耳聾耳鳴加之出血出膿則成聵耳底耳之患候其顴頰色黑者知其耳聾也亦有手少陽之脉動厥而聾者耳內渾渾惇惇也手太陽脉動厥而聾者耳內氣滿也大抵氣厥耳聾尚易治精虛耳聾不易藥諸証既殊治各有法

塞耳丸

治耳聾無不効

澹寮方名塞耳丹

石菖蒲

一寸

巴豆

去皮一枚

全蝎

一枚去毒

右為細末葱涎打和如棗核大綿裹納耳中

杏仁散 治耳卒痛或有水出

杏仁

一錢炒令焦

右研為末葱涎搜和捏如棗核大綿裹塞耳中

又方 治耳暴聾

雄黃

一錢

巴豆

一箇去殼

右同研令細用葱涎和作一錠子紙捲定塞耳中

茯苓丸

治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉茯苓

酒浸切
片焙

山茱萸

去核

石龍芮

石菖蒲

兔絲子

淘淨酒
浸蒸焙

川羌活

去蘆

鹿茸

燎去毛切
片酒浸蒸

磁石

火煨醋淬
七次水飛

石斛

去根

附子

炮去皮臍
各一兩

全

蝎

去毒二
七箇

麝香

一字
旋入

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸加至一

百丸空心鹽酒鹽湯任下

磁石丸

治風虛耳聾無聞

磁石

火煨

防風

去蘆

羌活

去蘆

黃耆

去蘆鹽水浸焙

木

通

去麋皮

白芍藥

桂心

不見火各一兩

人參

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半羊腎一對切片去脂膜煎至七分去滓食前溫服

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉翳腫掣痛濃血流
出

犀角

鎔

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小

豆

炒

甘菊花

去枝梗各一兩

甘草

炙半兩

右呔咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

玄參湯 治腎臟實熱心胃煩悶耳聽無聲四肢拘急
腰背俛仰強痛

生地黃

洗

玄參 五加皮

去木

黃芩 赤茯苓

去皮

通草

石菖蒲

甘草

炙

羚羊角

鎔

麥

門冬

去心各等分

右呔咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

鼻

論曰夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭矣若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其為病也為衄為癰為息肉為瘡瘍為清涕為室塞不通為濁膿或不聞香臭此皆肺藏不調邪氣蘊積於鼻清道壅塞而然治之之法寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄不可遽止如出

三升已上恐多者方可斷之活人書所謂衄血者乃解
蓋陽氣重故也不可不知

又論曰夫鼻者肺之所主職司清化調適得宜則肺臟
宣暢清道自利攝養乖方則清道壅塞故鼻為之病焉
蓋肺主於氣肝藏於血邪熱傷之則血熱血熱則氣亦
熱血氣俱熱隨氣上逆故為鼻衄甚則生瘡風寒乘之
陽經不利則為壅塞或為清涕蘊積不散則不聞香臭
或為鼻鼈或生息肉鼻痛之患矣又有熱留膽府邪移

於腦遂致鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄衄瞑目故得之氣厥也

梔子仁丸 治肺熱鼻發赤瘰俗曰酒瘡鼻

梔子仁

右為末溶黃蠟等分和為丸彈子大空心茶酒嚼下
半月効忌酒炙燂

又方

枇杷葉

去毛
焙乾

右為末茶調下一二錢日三服

辛夷散 治肺虛風寒濕熱之氣加之鼻內壅塞涕出

不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁

細辛

洗去土葉

藁本

去蘆

升麻

川芎

木通

去節

防風

去蘆

羌活

去蘆

甘草

炙

白芷

各等

分

右為細末每服二錢食後茶清調服

危亦林得効方加蒼耳一半熟

者茶調散

合和服

蒼耳散

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

孫氏仁存活法秘方云腦冷所

致此疾亦有腦熱者亦有肺寒者素問曰腦移熱於腦則辛頰鼻淵又曰泣涕者腦也腦滲為涕又曰肺之液為涕其來各有由矣當審詳之

鼻淵濁涕不止清濁亦自異

辛夷仁

半兩

蒼耳子

二錢半

香白芷

一兩

薄荷葉

半錢

右並日乾為細末每服二錢用葱茶清食後調服

口

論曰夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也蓋

五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五藏之氣也節宣微爽五藏之氣偏勝由是諸疾生焉且鹹則為寒酸則停滯澀則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃腑臟臊腐之不同蘊積於胃膈之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然醫療之法各隨其所因以治無使過與不及焉

又論曰夫口者脾之候齒者骨之餘髓之所養也人之一身此為大要凡有病起因口而成含惡氣以嚙津液

痰癖而在膈心胃壅滯毒氣攻烝熏之既久故齒為之病焉其諸風寒蘊熱而得之者方載於後

芎藭膏 治口氣熱臭

香白芷 芎藭

各等分

右為細末煉蜜丸如雞豆大食後臨卧噙化

丁香丸 治口臭穢

丁香

三錢

甘草

一錢炙

芎藭

二錢

白芷

半錢

右為細末煉蜜丸如彈子大綿裹一丸噙嚥津

碧雪 治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌根緊強言語不正腮項腫痛

蒲黃 青黛 硃砂 焰硝 甘草

各等分

右為細末每用手指捻摻於喉中津嚥或呷少冷水送下頻頻洗之

青金散 治小兒白口瘡急惡狀似木耳

洹川王
一即方

五倍子

去土垢
四兩

青黛

四錢

右為細末好油調鴉羽掃口向咽喉流入咽喉中瘡

爛次日便下兼治痔瘡亦佳

麝香散 治急疔惡蝕肉損

枯白礬

二兩

黃丹

一錢半炒

麝香

一字

右為細末研勻乾擦牙疔處頻上

朱粉散 治白口瘡惡及牙疔蝕

枯白礬

一兩

乾胭脂

一錢半

輕粉

半錢

麝香

少許

右研勻油調掃口瘡或乾貼

蛾黃散 治赤白瘡疹唇破兼治熱瘡

黃蘗

去皮

寒水石

燒

右各等分為細末乾貼口瘡上塗唇上兼治諸瘡較

遲者

粉紅散

治小兒白口瘡咽喉惡爛聲啞

乾胭脂

一錢

枯礬

一兩

右研勻每用一錢生蜜調如稀糊掃口瘡咽喉內咽
了藥來日大便退了瘡皮為驗

大青湯

治咽喉唇腫口舌糜爛疳惡口瘡

大青葉

升麻

大黃

剉炒各二兩

生地黃

切焙三兩

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服微利

止

升麻散 治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍藥

人參

洗

桔梗

去蘆

乾葛

各一兩

甘草

生用半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

瀉黃飲子 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼 去白 麸炒 黃芩 防風 去蘆 半

夏 湯洗 七次 石斛 各一兩 甘草 生用 半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘

時候

瀉黃散 治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩

唇口乾燥壅滯不食

藿香葉 七錢 石膏 煨 縮砂仁 山梔子仁 甘

草

炙各半兩

防風

去蘆四兩

右剉碎用蜜酒炒香焙為細末每服三錢水一大盞

煎至七分溫服不拘時候

利膈湯 治上膈壅熱口苦咽乾痰唾稠粘心煩喜冷咽喉生瘡疼痛一切上壅之證皆可服之

防風

雞蘇葉

桔梗

牛蒡子

荊芥穗

各一兩

川升麻

人參

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

橄欖散 治唇緊燥裂生瘡

橄欖

不拘多少燒灰

右為細末以豬脂和塗患處

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌重舌舌腫

或連頰兩邊腫痛

玄參 赤芍藥 升麻 犀角鎔 桔梗去蘆 貫

衆洗 黃芩 甘草炙各等分

右呔咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

杏仁膏 治口舌熱乾燥或舌上生胎語言不真

升麻

杏仁

去皮尖

甘草

炙各一兩

黑豆

五十粒炒去皮

右為細末入白蜜五合生地黃汁五合慢火熬成膏
子丸如雞荳大常噙一九津化嚥下舌上生胎止用
生薑片蘸冷水擦洗之亦妙

齒

論曰夫齒乃骨之餘氣骨乃腎之所主呼吸之戶門也
精氣強則齒自堅腎氣衰則齒自豁且手陽明大腸之
脉入於齒灌注於牙儻風寒壅熱之氣鬱滯心胃衝發
於口則齒為之病矣輕者為宣露齲頰浮腫甚則為疳
齲脫之證也亦有腎氣虛壅齒痛宣露當進補腎藥
其諸隨證施以治法

安腎丸 治虛熱牙齒浮腫疼痛

肉蓯蓉

酒浸
焙

石斛

去
根

桃仁

麩
炒

破故紙

炒

白朮

乾山藥

剉 炒

白茯苓

剉 炒 去

川烏

炮 去 皮 臍

川草薢

川巴戟

去 心 各 等 分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十九空心鹽

湯下

莽草散

治風壅熱氣上攻齒齲浮腫或連頰車疼痛

或宣露血出

莽草

川升麻

柳枝

槐角子

鶴虱

地骨

皮

藁本

去 蘆

槐白皮

右吹咀每服一兩水一盞入鹽少許煎至七分去滓
熱含冷吐之日用三次

必勝散 治齒衄

蒲黃

畧炒

螺兒青

等分

右為細末每用少許擦患處少待用湯鹽水漱之

驅毒飲 治熱毒上攻宣露血出齒齦腫痛不可忍者

屋遊

即瓦屋上青苔不拘多少洗淨

右煎湯澄清入鹽一小撮放溫頻頻漱之

牢牙散 治一切齒痛不問久新

全蝎

七個
去毒

細辛

洗淨
三錢

草烏

二個
去皮

乳香

別研
二錢

右為細末每用少許擦患處須臾以溫鹽水盥漱

香鹽散 此藥常用牢牙去風冷蛀齲宣露一切齒疾


大香附子

炒令極
黑三兩

青鹽

半兩
別研

右為細末和勻用如常法乃鐵甕先生良方也



欽定四庫全書

卷五

欽定四庫全書

子部
濟生方卷八
六至

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

膳錄貢生臣黃琮

膳錄監生臣單可圭

欽定四庫全書

濟生方卷六

宋 嚴用和 編

血氣

論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒哀憂思悲恐驚者七氣也七情之外益之以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身血隨氣行氣一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事將行預先作痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作寒熱或為癥瘕肌肉消瘦非特不能受孕久而不治轉而為瘵疾者多矣

延胡索湯 治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搐搦經候不調但是一切血氣疼痛並可服之

當歸

去蘆酒浸到炒

延胡索

炒去皮

蒲黃

炒

赤芍藥

官桂

不見火
各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木

香

不見火
各三錢

甘草

炙二
錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去

滓食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散

治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹疔痛

不可忍及惡露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹

痛並皆治之

牡丹皮

去木

赤芍藥

蓬莪朮

剉

荊三稜

剉

劉寄奴

去梗

熟地黄

酒浸蒸

延胡索

炒去皮

當歸

去蘆酒浸

烏藥

官桂

不見火各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空心食前溫酒調服

三神丸 治婦女血氣相搏腹中刺痛引心端經行

澀少或經事不調以致疼痛

橘紅

二兩

延胡索

去皮醋煮一兩

當歸

去蘆酒浸剉炒一兩

右為細末酒煮米糊為丸如桐子大每服七十九加至一百丸空心艾湯下米飲亦得

抑氣散 治婦人氣盛于血變生諸證頭暈膈滿皆可服之

香附子

炒淨
四兩

茯神

去木
一兩

橘紅

二兩

甘草

炙一兩

右為末每服二錢食前用沸湯調服

帶下

論曰巢氏病源論婦人有三十六疾所論三十六疾者

七癥八瘕九痛十二帶下是也然所謂十二帶下者亦不顯其證狀今人所患惟赤白二帶而已推其所自勞傷過度衝任虛損風冷據於胞絡此病所由生也且婦人平居之時血欲常多氣欲常少方謂主氣有原百疾不生儻或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交併則赤白俱下有室女或虛損而有此疾者皆令孕育不成以致絕嗣凡有是證速宜治之久而不治令人面色黧黯

肌肉瘦瘠腹脇脹滿攻刺疼痛甚至足脛枯細多苦逆
冷疴羸不能食矣診其脉右手尺脉浮浮為陽陽絕者
無子苦足冷帶下也

白堊丸 治婦人白帶久而不止面生黧黯遠臍疼痛

腰膝冷痛日漸虛困產後白帶並宜服之

白堊 火煨 禹餘糧 蝦醋淬 鼈甲 醋炙 烏賊骨 醋炙

當歸 去蘆酒浸 鵲巢灰 乾薑 炮 紫石英 火煨醋淬

附子 炮去皮臍 金毛狗脊 燎去毛 芎藭 各一兩 艾葉

灰

半兩

鹿茸

燎去毛切片
醋炙一兩

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十九空心溫酒米飲任下

白斂圓

治室女衝任虛寒帶下純白

鹿茸

醋蒸焙
二兩

白斂

金毛狗脊

燎去毛
各一兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸如桐子大每服五十丸空心溫酒下

當歸煎 治婦人室女赤白不止腹內疼痛四肢煩疼

不欲飲食日漸羸瘦

當歸

去蘆酒浸

赤芍藥

牡蠣

大煨取分

熟地黄

酒焙蒸

阿膠

剉蛤粉炒成珠子

白芍藥

續斷

酒浸各一兩

地榆

兩半

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五十丸空心米飲下

卷栢丸 治婦人室女腹臟冷熱相攻心腹絞痛腰痛腿痛赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

黃耆

去蘆蜜
水炙

熟地黃

洗各一
兩半

卷栢

炙醋

赤石

脂

煨醋淬
七次

鹿茸

炙醋

白石脂

芎藭

代赭石

煨醋淬
七次

艾葉

炙醋

桑寄生

鼈甲

炙醋

當歸

去蘆

酒洗
微炒

地榆

各一
兩

木香

不見
火

龍骨

各半
兩

乾

薑

炮三
分

右為末醋煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九空

心食前米飲下

血瘕

論曰腹中之病經書所載有積有聚有癖有疝有癥有
瘕蓋積者五藏所積其痛不離其部聚者六腑所聚其
痛無有常處癖者病據兩脇之傍疝者弦急而多痛癥
者徵也有塊可驗瘕者假也假物成形其結聚浮假推
移乃動此無他皆由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟
腑虛弱受于風冷與氣血相結而成也惟婦人血瘕為
病異於丈夫其所以異者非獨關於飲食不節而已多
因產後勞動太早喜怒不調臟虛受寒或月水往來取

涼過度惡血不散遇寒搏則凝皆能成血瘕也病作之時令人心脇攻刺少腹痛重或腰背互相引而痛久而不消令人黃瘦羸弱遂致絕產診其脉弦急大者生虛小弱者死不治

三稜煎丸 治婦人室女血瘕月經不通臍下堅結大如杯升而不治必成血蠱

京三稜 蓬朮

各二兩

芫花

半兩

青皮

去穢淨一兩半

右剉如豆大用好醋一升煮乾焙為細末醋糊為丸

如桐子大每服五十丸食前用淡醋湯下

琥珀丸 治婦人血瘀腹中有塊攻刺小腹痛重或腰

背相引而痛久而不治黃瘦羸乏

琥珀

研別

白芍藥

川烏

炮去皮

川牛膝

去蘆酒浸

鼈甲

醋炙

蓬莪茂

炮

當歸

去蘆酒浸

厚朴

薑製炒各一兩

木香

不見火

澤蘭葉

官桂

不見火各半兩

麝香

別研半錢

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心溫

酒米飲任下

通經丸 治室女月經不通臍下堅結大如杯發則寒熱往來此名血瘕

當歸

去蘆酒浸一錢半

蓬朮

地

桂心

不見火

青皮

去白

大黃

炮

乾薑

地

桃仁

去皮尖炒

乾漆

炒令烟盡

紅

花

川椒

去目及閉口者微炒故地上密蓋出汗各一錢

右十味為末將一半用醋煮熬成膏一半入雞子清

同搗勻丸如桐子大每服二十九丸空心淡醋湯下

六合湯 治婦室經事不行腹中結塊疼痛腰痛腿痛

當歸

去蘆酒浸

白芍藥

官桂

去皮

熟地黃

川芎

蓬朮

炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫空心服

崩漏

論曰崩漏之疾本乎一證輕者謂之漏下甚者謂之崩中且婦人平居經脉調適衝任二脉互相滋養陰陽二氣不相偏勝則月事以時下儻若將理失宜喜怒不節疲極過度大傷於肝蓋肝為血之府庫喜怒勞役一或

傷之肝不能藏血于宮宮不能傳血于海所以崩中漏下漏下者淋瀝不斷是也崩中者忽然暴下乃漏證之甚者其狀或如豚肝或成五色與血俱下又或如泔涕如爛瓜汁又或如豆羹汁如藍靛色至有黑如乾血相雜亦有純下瘀血此皆衝任虛損喜怒勞役之過致傷于肝而然也久久不止面黃肌瘦虛煩口乾臍腹冷痛吐逆不食四肢虛困甚則為脹為腫診其脉寸口脉弦而大弦則為減大則為乳減則為寒乳則為虛虛寒相

搏其脉為革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉
浮者不可治治之之法調養衝任鎮注血海血海溫和
歸于有用內養百脉外為月事自無崩中漏下之患矣
又論曰崩漏之疾本乎一證然有輕重之別焉輕者為
之漏下漏下者淋瀝不斷是也重者謂之崩中忽然暴
下下而過多真陰走耗遂致頭暈眼花氣乏怔忡身體
羸瘦飲食減少腹內冷痛四肢無力驚惕恐怖此其證
也前方論治有對證服之而作効者亦有試之而罔功

者非藥之不應乃由衝任極虛血海極寒故爾蓋血暖則流暢外為月事內灌百脉今既虛極而又寒極血寒則凝而不運是以崩中不已狀如豚肝或下五色或與血俱下或如泔涕或如豆羹汁或如藍靛色或純下瘀血此血寒之極所致若謂血熱致崩而用涼藥誤矣每用歲丹作效始進三五粒而未愈再進十粒猶未愈服至四五十粒差愈服至百粒方能作効此歲丹之力也然歲丹之性全恃火力如水寒成冰血寒成塊血得溫

則流散四肢冰得日則烘消成水血凝得丹而流暢火
之力也大抵醫者意也以意醫之所以作效儻或疑而
未敢輕用先進陽起石丸服之二日未効却進歲丹庶
無可疑矣又有室女二七天癸當至亦有當至而未至
者近十八九左右方行者有卒然暴下亦有淋瀝不止
有若崩漏者却又不宜服前二藥也惟當以四物湯加
香附子煎血色鮮而不止者挾熱也宜去熟地黃加生
地黃煎臨病之際又在乎審處之

鎮宮丸 治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定或

如豆汁或狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久

久不止令人黃瘦口乾胸煩不食

代赭石

火煨醋
淬七次

紫石英

火煨醋
淬七次

禹餘糧

火煨
醋淬

七次
香附子

醋炙各
二兩

陽起石

煨紅
細研

芎藭

鹿

茸

燎去毛
醋蒸焙

茯神

去木

阿膠

剉蛤粉炒
成珠子

蒲黃

炒

當歸

去蘆酒浸
各一兩

血竭

別研
半兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米和丸如桐子大每服

七十九空心米飲下

十灰丸 治崩中下血不止

綿灰 黃絹灰 艾葉灰 馬尾灰 藕節灰

蓮蓬灰 油髮灰 赤松皮灰 椶櫚灰 蒲黃

灰

右等分為細末用醋煮糯米糊為丸如桐子大每服
七十九加至一百九空心米飲下

栢子仁湯 治婦人憂思過度勞傷心經心主于血心

虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸

去蘆酒炒

芎藭

茯神

去木

小草

阿膠

剉粉炒

成珠

鹿茸

燎去毛酒蒸焙

栢子仁

炒各一兩

香附子

炒去

子

毛二

兩

川續斷

酒浸一兩半

甘草

右呔咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

空心食前溫服

陽起石丸 治衝任不交虛寒之極崩中不止變生他

證

陽起石

火煨紅別研
今極細二兩

鹿茸

去毛醋
炙一兩

右為細末醋煎艾汁打糯米糊為丸如桐子大每服

百丸空心食前米飲下

加減四物湯 治室女二七天癸至亦有當時未至而

後至者有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多

變生諸證悉宜服之

川當歸

去蘆酒潤
切焙一兩

川芎

一兩

熟地黄

洗淨
一兩

白

芍藥

一兩

香附子

炒去毛
一兩半

右呔咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓食前溫服如血色鮮而不止者去熟地黃加生地黃煎

搐搦

論曰婦人室女有生平無病者一旦忽感手足搐搦之證痰涎壅塞精神昏憤不省人事醫者往往便作癇證治之非也蓋婦女以肝氣為主肝乃血之府庫肝既受病經候愆期或多或少或閉斷不通肝宮壅塞隨其虛

實而生病焉婦人多由血虛七情感而生風女子血實
七情感而生熱邪乘四末是以卒然手足搐搦狀類癇
證也治療之法先宜多進蘇合香丸溫酒化服以快其
氣俟其甦醒亟用調經之法塞者通之通者調之虛者
與之實者取之婦人宜服白薇丸女子宜服澤蘭丸多
服以病退為期也

白薇丸

白薇 紫石英

大煨醋
淬七次

琥珀

別研

白芍藥

桂

心

火 不見

川續斷

酒 浸

防風

去 蘆

山茱萸

肉 取

當

歸

去 蘆 酒 浸

栢子仁

炒

川烏

炮 去 皮 尖

牡丹皮

去 木 各 一

兩

木香

不 見 火 半 兩

麝香

別 研 半 錢

右為細末生薑自然汁打米糊為丸如桐子大每服
七十九空心食前溫酒米飲任下

澤蘭丸

當歸

去 蘆 酒 浸

澤蘭葉

琥珀

別 研

羚羊角

鎊 別 研

防風

去 蘆

牡丹皮

去 木 各 一 兩

麝香

別 研 半 錢

安息香

酒煮去滓

砂石半錢

生地黃

赤芍藥

各兩半

鐵粉

半兩

橘

紅錢五

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十九空心食
前溫酒米飲任下

欽定四庫全書

濟生方卷七

宋 嚴用和 編

求子

論曰素問云夫天地者萬物之父母也陰陽者血氣之男女也夫有夫婦則有父子婚姻之後則有生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血先至陽精後衝血開裹精陰外陽內陰含陽胎而男形成矣陽精先至陰血後參精開裹血陽外陰內陽含陰胎而女形

成矣男女婚姻貴乎及時夫婦貴乎強壯則易於受形也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理或男子真精氣不濃婦女血衰而氣旺是謂夫病婦疹皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽和平則婦人樂有子矣

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿體痛怔忡皆可服之香附子乃婦人之仙藥不可謂其

耗氣而勿服

釋繼洪澹寮方云大槩婦人只宜血盛氣衰所以醫家多為抑陽助陰陽氣陰血

香附子

炒杵淨四兩

茯神

去木

甘草

炙各一兩

橘紅

二兩

右為細末每服二錢食前用沸湯服仍兼進紫石英

丸

陽起石丸

治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子

陽起石

火煨紅研極細

鹿茸

酒蒸焙

韭子

炒

兔絲子

水淘淨酒浸蒸焙別研細

天雄

炮去皮

肉蓯蓉

酒浸各一兩

覆盆子

酒浸

石斛

去根

桑寄生

沉香

別研

原蠶蛾

酒炙

五味子

各半兩

右為細末酒煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九

空心鹽湯鹽酒任下

妊娠

論曰內經云陰搏陽別謂之有子三部脉浮沉正等無病者乃知有娠也妊既受矣多病惡阻惡阻者俗諺所謂惡食是也此由婦人本虛平時喜怒不節當風取冷中脘宿有痰飲受妊經血既閉飲血相搏氣不宣通遂

致心下憤悶頭暈眼花四肢沉重懈怠惡聞食氣喜食
鹹酸多卧少起甚則吐逆不自勝持理療之法順氣理
血豁痰導水然後安平矣

又論曰妊娠四月六月多苦煩悶按醫經四月受少陰
君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣又有不定
拘此兩月而苦煩悶者由母將理失宜七情傷感心驚
膽怯而然也

論曰懷妊十月形體就成八月合進瘦胎易產之藥今

世多用枳殼散非為不是若胎氣肥實可以服之況枳殼大能瘦胎胎氣本怯豈宜又瘦之也不若進救生散安胎益氣令子緊小無病易產又且多少穩當

安胎和氣散

訶子

麩裏煨
去核

白朮

各一兩

陳皮

去白

高良薑

剉炒

木香

不見火

白芍藥

陳米

炒

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去

滓溫服不拘時候忌生冷物

杜仲丸 治妊娠三兩月胎動不安者可預服養胎

杜仲

去皮剉薑汁浸炒去絲

川續斷

酒浸各一兩

右為細末棗肉煮爛杵和為丸如桐子大每服七十丸空心米飲下日二服

如聖散 治胎動腹痛者何蓋胎動腹痛其理不一或緣飲食冷熱動風毒物或因再交搖動骨節傷犯胞胎其候多嘔氣不調和或服熱藥太過氣血相半急服順氣安胎不然變成漏胎則難安矣

鯉魚皮

當歸

去蘆酒浸

熟地黄

酒蒸

阿膠

劉蛤粉炒成珠子

白芍藥

川芎

川續斷

酒浸

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半入苧根少許生薑五片煎至七分去滓空心食前溫服

旋覆半夏湯

治妊娠惡阻心下憤悶吐逆不食惡聞

食氣頭暈四肢百節煩痛多卧少起

旋覆花

去枝萼

芎藭

細辛

洗去土

人參

甘草

炙半兩

半夏

湯泡七次

赤茯苓

去皮

乾生薑

陳皮去白各一兩

當歸去蘆酒浸一兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

人參半夏丸 治妊娠惡阻病醋心胃中冷腹痛吐逆不喜飲食

半夏泡七次

人參

乾生薑各半兩

右為細末以生地黄汁浸蒸餅為丸如桐子大每服四十丸米飲下不拘時候

縮砂散 治妊娠胃虛氣逆嘔吐不食

縮砂仁

不拘多少

右為細末每服二錢入生薑自然汁少許沸湯點服

不拘時候

百合散 治妊娠風熱相交欬嗽痰多心胃滿悶

百合

蒸

紫菀茸

洗

貝母

去心

白芍藥

前胡

赤茯苓

去皮

桔梗

去蘆炒各一兩

甘草

炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

消風散 治證同前

石膏

煨

甘菊花

去枝梗

防風

去蘆

荆芥穗

川羌活

去蘆

羚羊角

鎊

川芎

大豆黃卷

炒

當歸

去蘆酒洗

白芷

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半入好茶半錢煎至八分

去滓通口服食後良

芎蘇散

治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋者何

蓋因風寒客於皮膚傷於榮衛或洗項背或當風取涼致令頭目昏痛增寒發熱甚至心胃煩悶大抵產前二命所係不可輕易妄投湯劑感冒之初止宜進芎蘇散以發散表邪其病自愈

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮 麥門冬

去心

陳皮 去白 乾葛 各一兩 甘草 炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片蔥白二寸煎至八分去滓溫服不拘時候

驅邪散 治妊娠瘧疾蓋榮衛虛弱脾胃不足或感風

寒或傷生冷傳成瘧疾急服驅邪散莫待吐逆見物不

思卒難醫療

高良薑

剉炒

白朮

草薢仁

橘紅

藿香葉

縮砂仁

白茯苓

去皮各一兩

甘草

炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至八分去滓溫服不拘時候

冬葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及

水腫

冬葵子

三錢

赤茯苓

去皮
二錢

右為細末每服三錢米飲調服不拘時候利則住服
如不通恐是轉胞加髮灰少許神效

麥門冬湯

治子煩

阮霖經驗良方云治
妊娠心驚膽怯煩悶

麥門冬

去心

防風

白茯苓

去皮各
一兩

人參

半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片入淡竹葉十
片煎至八分去滓溫服不拘時候

羚羊角散

治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語謇

澀痰涎不消或發搐搦不省人事名曰子癇亦宜服之
阮霖經驗良方云心支之女患此正是雪寒之時用此效

羚羊角

鎔

川獨活

去蘆

酸棗仁

炒去殼

五加皮

去木各半錢

薏苡仁

炒

防風

去蘆

當歸

去蘆酒浸

川芎

茯神

杏仁

去皮尖各四分

木香

不見火

甘草

炙各二分半

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時候

產後

論缺

芎歸湯 治大產小產對證加添服餌

芎藭 當歸

去蘆酒浸

右等分咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾薑白芍藥水停心下微嘔逆加茯苓生薑虛煩不得眠加人參竹葉大便秘澀加熟

地黃橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹加厚
朴血崩不止加香附子欬嗽痰多加紫菀半夏生薑
腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加延胡索惡血不下腰
腹重痛加牡丹皮

芎藭補中湯 養新血去瘀血補虛扶危

乾薑

炮

阿膠

剉蛤粉炒

芎藭

五味子

各一兩

黃耆

去蘆蜜水炙

當歸

去蘆酒浸

白朮

赤芍藥

各一兩

木香

不見火

人參

杜仲

去皮剉炒

甘草

炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓通口服
不拘時

豬腰子粥 治產後尋勞發熱

豬腰子一隻去白膜切作柳葉片少鹽酒拌之先用
粳米一合入蔥椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盞底用
熱粥蓋之如作盒生粥狀喫之每日空心作粥極妙
金液丸 治將產忽見橫倒者蓋不能忌口恣情多食
五臟氣滯六腑不和胎氣既肥則用力太早胎受驚觸

急用瘦胎金液丸其兒身自順生矣

飛生毛

火燒如腋下毛尤佳半錢

血餘

無病女人髮燒炭

公母羊糞

燒灰各半錢

竈中心土

一錢

黑鉛

三錢用小銚子火上鎔投水銀半錢急攪成砂子傾出細研

硃砂

半錢別研

右為細末用粽子角為丸如菴豆大遇難產急難以倒流水吞下五丸兒身自順正產子母活矣

抵勝湯

治胃受水穀脾主運化生血生氣內濡腑臟

者也因產腑臟暴虛惡露下少敗血乘虛散於脾胃脾

受之而腹脹胃受之則成吐逆亦有惡露過多氣無所主聚於脾胃脾受之則為腹脹胃受之則吐逆惡露過多者去澤蘭赤芍藥倍加生薑橘皮

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮

各一分

甘草

一錢

右以咀每服一劑用水一碗生薑焙乾半兩煎至半碗去滓分三服

產後中風

論曰產後中風者蓋因產後傷動血氣勞損經絡腠理
空疎勞役太早風邪乘間而入始則客於皮膚次則入
於筋脉又其次也傳於諸臟隨其諸臟經絡而生病焉
或身體緩急或頑痺不仁或口目不正或奄奄忽忽神
情昏亂乃中風候宜服小續命湯阮霖經驗良方凡產後氣血暴虛未得安
靜血隨氣上迷亂心神氣息欲絕暈悶不知人
口噤手足痙瘓醫者不識呼為暗風誠為謬矣
小續命湯 治婦人產後失血中風冒昧不知痛處拘
急不得轉側四肢緩急遺失便利

麻黃

去根節煎
掠去沫焙

桂

去粗皮

甘草

炙各二兩

人參

白朮

附子

炮去皮臍

防己

芍藥

黃芩

去黑心各一兩

防風

一兩半

右剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入生薑三片煎取七分去滓溫服

產後血崩

方缺

論曰產後血崩者蓋因產所下過多血氣暴虛未得平復或因勞役或因驚怒致血暴崩又有榮衛虛傷氣衰

血弱亦變崩中若小腹滿痛此為肝經已壞為難治若
小腹脹滿此為內有瘀血未可止之止之非特淋瀝不
已小腹轉加脹滿若小腹脹滿且復芤芩湯及黑龍丹
若小腹不滿急是內無瘀血可服固經丸止之惡熱藥
者進十灰丸亦得

欽定四庫全書

濟生方卷八

宋 嚴用和 編

丁瘡

附熱瘡

論曰諸瘡莫急於丁瘡有魚眼丁多發於足非神手不能治也大凡治丁瘡先以披頭針當頭刺之直至患者知痛處纔引針而出血隨之流則以蟾酥追毒丹納針孔中仍以紙撚送下使近痛處其上封以乳香膏四膀腫處敷以烏龍膏或有赤暈敷以解毒散並如前法三

兩日瘡潰拔去仍覆以乳香膏膿盡生肌並如前法

嵇云有絲瘡證乃丁瘡之類醫若不識便無治法害人最速其瘡生手足間有黃泡其中或紫黑色即有一條紅絲迤邐向上而生若至心腹則使昏亂不救其紅絲或有生三兩條者治法以針橫截紅絲所至之處刺之止使血出以膏藥傅之更不復發動即愈矣此證得於喜怒不節血氣逆行而生內翰洪舜俞以惡瘡生齧上久不能治嵇云此名內疳瘡初發如蓮花痔根蒂小而

下垂反大治法以勾刀決斷其根燒鐵器令七八赤烙之以止血次以雄黃輕粉粉霜香白芷白欽為散敷其上令病人側卧以槐枝作枕支其牙頰間毋使口合一兩時許瘡癰定令病者自便治日得膿便可漸愈若此證久不治即四邊肉漸成死肌法用槐枝枕支病者牙毋使得合以小鎌去其惡肉令盡即撒生肌散上仍用乳香膏護之自非飲食時且令病者側卧支其牙頰毋使口合則津液不衝動瘡藥三日後肌肉漸生纔可令

病人自便無所疑矣洪內翰云此證緣醫家不識則無
治法以至不救良可惜也此證得之作勞氣血虛憊所
至治驗

嵇云治魚眼丁之法先以鍼刺之若痛則瘡根已走矣
用療漏瘡之法以榆皮隨俞穴所往探之榆所不及之
處則針破引榆皮而出再自針穴尋之若鍼破處病人
自痛血出則是活肌肉矣即于鍼瘡納蟾酥丹覆以乳
香膏再於瘡鍼孔中納蟾酥丹三二粒仍覆以乳香

二黃散 治丁腫

雄黃

雌黃

各等分

右為末先用鍼刺四圍及中心醋和塗之

蟾酥丹

蟾酥

一枚

右為末以白麵和黃丹丸如麥顆狀鍼破患處以一

粒內之神妙

灸法 治丁腫灸掌後橫紋五指男左女右七壯即瘥

已用得效丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於意表也
考嵇治法金大定間有遇異人傳狗寶丹丸得之者以
獻偽主其後嵇事偽朝以外科奉御療將士金瘡有功
金主以金帛賜焉嵇治瘡凡癰疽丁漏惡瘡皆先以狗
寶丸為第一義先投狗寶丸半時次投熱葱粥以助之
厚被蓋覆病者使汗出周浹則毒勢隨汗而解若汗不
出則不可療矣汗罷則瘡之陷者必起散者必聚次以
烏龍膏傅其腫若腫之外有赤暈者則以解毒散傅之

凡傳藥必先自外向裏塗之看正瘡大小凡正瘡之上並不許加分毫藥每日隨證服五香連翹湯十奇散棗豆粉等藥大率以狗寶丸為先以烏龍膏解毒散次之而服餌之藥則隨脉氣陰陽虛實而用之空心必服加減八味丸以助元氣俟瘡潰以針決去敗膿訖然後以乳香膏傳正瘡之上若尚有未盡膿則於膏藥當中直翦一路以通膿水膿欲盡以生肌散敷瘡口仍以乳香膏覆之更不須翦破膏藥乳香膏一日一換俟瘡口欲

合即便不加膏藥矣烏龍膏之功在於消腫解毒散之功在於收暈即不用解毒散而烏龍膏直俟瘡潰敗膿出盡然後已此其大畧也癰疽之證甚惡多陷下透骨者服狗寶丸瘡四邊必起依前法用烏龍膏解毒散訖須用針刀開瘡孔其內已潰爛不復知痛乃納追毒丹於孔中以速其潰既潰後割去死肌洗以豬蹄湯敷以生肌散覆以乳香膏又傳之善角散以醋熬為糊貼之惡肉退去好肉漸生即用搜膿散翠霞散之類粧之若

瘡中毒氣未盡慎勿早斂忌早上生肌之藥縱復平復必再發其間調理次第臨時制宜將護須慎之

狗寶丸

專治癰疽發背附骨疽諸般惡瘡

狗寶

一兩生用癰狗腹中得之

蟾酥

二錢

乳香

別研

沒藥

別研

雄黃

硃砂

輕粉

麝香

鉛白霜

粉霜

別研各一錢

金頭蜈蚣

七箇頭尾脚足炙黃色研如泥

烏金石

即石灰泰州萍鄉縣有之二錢重

鯉魚膽

七箇乾者用之去皮臘月者尤佳

狗膽

一箇乾者用之去皮
黑狗者臘月者好

頭胎孩兒乳合

黃蠟

三錢

右先將頭胎兒乳黃蠟放在鉢內文武火化開用前藥末和成劑放在甕器內要用旋丸如麻子大兩丸如病大三丸用白丁香七箇直者為妙以新汲水化開送下狗寶丸腰以下病食前服腰以上病食後服如人行三里用熟葱白粥投之即以衣被蓋定汗出為度已後只喫瓜蘆白粥常服十奇散留頭四邊以

烏龍膏貼之

追毒丹 治疽瘡黑陷者先用狗寶丸治次以烏龍膏

收腫散毒去赤暈乃用針刀開瘡納追毒丹使之潰然

後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆

七粒去皮心不去油研如泥

白丁香

錢一

雄黃

黃丹

各二錢

輕粉

錢一

加蟾酥尤神速

右件研和加白麵三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納之上覆以乳香追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去

不可治亦以此法追毒去死肌乃養肉斯愈矣疾小者用一粒大者加粒數用之

解毒散 去熱腫取赤暈

寒水石

二兩

龍骨

半兩

黃連

去鬚

黃蘗

各一兩

輕粉

一錢

右為細末和雞子清調以雞羽掃瘡上若是熱瘡加黃丹半兩

烏龍膏 治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子

去殼

半夏

各一兩

小粉

四兩

草烏

半兩

右於鐵銚內慢火炒令焦為細末出火毒再碾細以冷水調敷一日一換

紅膏藥

治軟癰及惡瘡風濕所搏渾身疼痛

瀝青

白膠香

各二錢

黃蠟

右於銚內煎化量用麻油三錢許煎濾於水盆中揉成劑收之每用於水內捻作餅子隨瘡大小貼之上傳以紙此藥加當歸一兩於內煎令黃色濾去滓於

水盆內取出藥搽成劑再加乳香末二錢和為乳香膏尤佳其加青黛者即名清金膏其加黃丹者即名紫金膏皆貨藥者誑人之術其功用一而已矣

生肌散

寒水石

錢二

黃丹

錢半

龍骨

錢七

輕粉

錢一

右為細末乾傅上貼以乳香膏

竹茹膏

治黃泡熱瘡

真麻油

二兩

青木香

二兩

青竹茹

一小團

杏仁

二七粒
去皮尖

右藥入麻油內慢火煎令杏仁黃色去滓入松脂研半兩熬成膏每用少許擦瘡上

治頭瘡及諸熱瘡

先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裏乾後用百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

肺癰

論曰夫肺癰者由風寒之氣內舍於肺其氣結聚所成

也蓋肺為五藏之華蓋其位象天候於皮毛氣之所主
將理失宜勞傷氣血風寒得以乘之蓋寒則生熱風極
亦生熱壅積不散遂成肺癰矣肺癰之狀寸口脉數而
實欬而胃內滿隱隱痛兩肘腫滿咽乾口燥煩悶多渴
時出濁唾腥臭久久吐膿狀如粳米粥者難治有膿而
嘔者不可治嘔膿而止者自愈凡病肺癰脉來短濇者
順浮大者死其色當白而多赤者亦死

桔梗湯

治肺癰心胃氣壅欬嗽膿血心神煩悶咽乾

多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澀

桔梗

去蘆

貝母

去心膜

當歸

去蘆酒浸

蘇蘇子

枳殼

去瓤炒

薏苡仁

炒

桑白皮

蜜水炙

防己

各一兩

甘草節

生用

杏仁

去皮尖炒

百合

各半兩

黃耆

去蘆一兩半

右呔咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓溫服不拘時候若大便秘者加大黃小便秘者加

木通

痔

論曰痔凡有五卽牡痔牝痔腸痔脉痔血痔是也素問云因而飽食筋脉橫解腸澼為痔多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩久坐濕地情慾耽著久忍大便遂使陰陽不和關格壅塞風熱下衝乃成五痔肛門生妒或左或右或內或外或狀如鼠竅或形似櫻桃或膿或血或痒或痛或軟或硬或畧或腫久而不治則成漏矣治之之法切不可妄用毒藥亦不可輕易割取多致淹滯惟

用穩重湯劑徐徐取效不可不知

黃耆丸 治五痔出血疼痛

槿藤子

煨用肉半兩

川續斷

酒浸

黃耆

去蘆

貫衆

附子

炮去皮臍

黃礬

別研

刺蝟皮

燒灰

當歸

去蘆酒浸

阿膠

蛤粉炒各一兩

麝香

別研一字

右為細末米糊為丸如桐子大每服七十九空心米飲下氣壯多熱之人不宜服此

斷紅丸

治陽虛臟腑久而腸風痔疾下血不止或所

下太多面色萎黃日漸羸瘦

側柏葉

微炒黃

川續斷

酒浸

鹿茸

燎去毛酒煮

附子

炮去皮臍

黃耆

去蘆

阿膠

剉蛤粉炒成珠子

當歸

去蘆酒浸各一兩

白礬

枯半兩

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十九空心食前米飲下

蝸牛膏 敷痔有效

蝸牛

一枚

麝香

三分

右用小砂合子盛蝸牛以麝香糝之次早取汁塗痔處

枯礬散 治五痔痒多痛少或膿或脹或漏血不止

白礬

枯半錢

腦子

一字別研

右為末先用魚腥草煎湯放溫洗痔次用藥少許糝

患處

蛻皮丸 治五種痔漏

豬左足懸蹄

燒灰存性

蛻皮

一枚燒灰存性

黃牛角腮

燒灰存性

貫衆 槐角子

炒

雷九

雞冠花

槐花

炒

油髮灰

黃耆

去蘆

香白芷

當歸

去蘆酒浸

枳殼

去瓢生用

玄參

黃連

去鬚

防風

去蘆

鼈甲

醋煮各半兩

麝香

別研半錢

右為細末米糊為丸如桐子大每服七十九加至一百丸空心米飲下年高虛弱寒濕痔疾不宜服之

瘻

嵇云澄江治一婦人漏瘡此婦人先於小腹下成一漏

瘡久又於背脊腰下成一瘡嵒以榆枝自背探之乃直達於腹前之漏瘡乃兩用追毒丹乳香膏烏龍膏而愈嵒云癰之根脚淺而濶僅治之遲則有潰爛肌肉之患若久而不合則多為漏瘡治癰已具於前

嵒云漏瘡當探其深淺渠在北地時有一人害漏瘡於脇間嵒以榆皮細枝刮去皮取線以綿裹其尖以線牢繫之以榆皮探瘡中之穴乃自脇而達於腰在皮膚之間遂於病者腰間以針決破用追毒丹三粒納於瘡中

三日即潰而脇間之漏遂止其膿悉自腰間針孔中出膿盡生肌散愈其服狗寶丸敷烏龍膏乳香膏生肌散並如前法

疥

論曰夫疥瘡之為病雖若不害人然亦至難忍矣素問云諸痛痒瘡皆屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方有所謂馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至遍體或痛或癢或腫或皮

肉隱癰或抓之凸起或痞癰或膿水浸淫治之內則當理心血祛散風熱外則加以敷洗理無不愈

當歸引子 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡

疥或腫或痒或膿水浸淫或發赤疹痞癰

當歸

去蘆

白芍藥

川芎

各一兩

生地黃

洗

白蒺藜

炒去尖

防風

去蘆

荊芥穗

各一兩

何首烏

黃耆

去蘆

甘草

炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

神異膏 治一切瘡疥

全蝎

七箇
去毒

皂角

一錢
剉碎

巴豆

七箇
去殼

蛇床末

三錢

麻油

一兩

黃蠟

半兩

輕粉

半字

雄黃

別研
三錢

右先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化開取出冷處入雄黃蛇床末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗以藥擦瘡疥上

苦參湯

苦參 蛇床子 白礬 荊芥穗

各等分

右四味煎湯放溫洗

癬

論曰夫癬之為病種狀不同古方有所謂乾癬風癬苔癬之類癰疹如錢漸漸滋蔓或痒或痛或圓或斜其中生蟲搔之有汁此有風濕毒氣與血相搏凝滯而為此疾也

胡粉散 治一切癬神效

胡粉

一分

硃

半

硫黃

別研一分

斑貓

一枝

麝香

少許

蝎梢

七枚

雄黃

別研一分

大草烏

一箇生用

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

癰瘤

論曰夫癰瘤者多由喜怒不節憂思過度而成斯疾焉大抵人之氣血循環一身常欲無滯留之患調攝失宜氣凝血滯為癰為瘤癰者多結於頸項之間瘤者隨氣

凝結於皮肉之中忽然腫起狀如梅李子久則滋長醫
經所謂癭有五種瘤有六證五癭者石癭肉癭筋癭血
癭氣癭是也六瘤者骨瘤脂瘤膿瘤血瘤石瘤肉瘤是
也治療之法五癭不可決破破則膿血崩潰多致夭枉
六瘤者脂瘤可破去脂粉則愈外五證亦不可輕易決
潰慎之慎之

破結散 治石癭氣癭筋癭血癭肉癭等證

海藻

洗

龍膽

海蛤

通草

昆布

洗

礬石

枯

松蘿

各三分

麥麴

四分

半夏

二分湯
泡七次

貝母

去心
二分

右為細末酒服方寸匕日三忌甘草鯽魚豬肉五辛

菜諸雜等物

昆布丸 治一切癭瘤不問久新

昆布

洗

海藻

洗

小麥

各一兩好
醋煮乾

右為細末煉蜜為丸如杏核大每服一丸食後噉嚥

瘰癧

論曰夫瘰癧之病即九漏是也古方所載名狀不一難以詳述及其生也多結於項腋之間累累大小無定發作寒熱膿水潰漏肺主虬蟬漏心主蟻螬漏膽主浮蛆漏腎主瘰癧漏小腸主轉脉漏原其所自多因寒暑不調飲食乖節遂致血氣壅結而成

皂子丸 治瘰癧滿項不破及結核腫痛者

好皂角子一升

玄參

連翹仁

各一兩

右用水五升砂鍋內慢火煎水盡為度每服揀取好

皂角子軟者三粒食後臨卧時細嚼津下硬者搗爛
蜜和如榛子大含化半月必差忌酒麪熱毒物

三聖丸 治療癰

丁香

五十箇

斑貓

十箇

麝香

一錢別研

右為細末用鹽豉五十粒湯浸研如泥和前藥令勻
丸如菉豆大每服五七丸食前溫酒下日三服如至
五七日外覺小便淋瀝是藥之效便加服或便下如
青筋膜之狀是病之根也忌濕麪魚肉一切動風物

連翹丸 治療癰結核破或未破者

薄荷

新者二觔
裂取汁

好皂角

一挺水浸去皮裂取汁
已上二味同於銀石器

內熬
成膏

青皮

一兩

連翹

半兩

陳皮

一兩不
去白

皂角子

慢火炮去皮取皂子
仁搗羅為末一兩半

黑牽牛

一兩半半
生半炒

右五味為末用前膏子為丸如桐子大每服三十九
煎連翹湯下食後十日見效

金瘡

奪命散 治金瘡打損及從高墜下木石所壓內損瘡

血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蛭

用石灰慢火炒
令焦黃色半兩

大黃

二兩

黑牽牛

二兩

右各為細末每服三錢用熱酒調下如人行四五里
再用熱酒調牽牛末二錢催之須臾臍轉下惡血成
塊或成片惡血盡即愈

